

Hab. in dumetis *Galliæ austro-orientalis*. — *Isère*: prope pagum dictum *Charancieu*.

E tribu *Synstylearum* D. C. *cat. hort. Monsp.* p. 137, affinis *R. arvensis* L. *mant.* 240, pedunculis glabris præter notas supra allatas, ab eâ præsertim differt fructu obovato nec subgloboso.

7. **Rosa commiserata**, Gdgr.

Ramosissima, repens vel decumbens; aculeis raris, rectiusculis; foliis late ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice vix attenuatis, præter costam subtus hirtellam utrinque glaberrimis; serraturis simplicibus, ovatis; petiolis aculeatis, pubescentibus parcissime glandulosis; pedunculis hispidis; tubo-obovato glabro; sepalis ovatis subpinnatis, apice filiformibus; stylis ultra discum planum in columnam glaberrimam productis; petalis albis haud ciliatis; fructu ovoideo basi attenuato.

Habitat in *Galliâ boreali-occidentali*. — *Calvados*: *Arganchy* (Dr. E. Lebel).

Affinis *R. repentis* Scop. *fl. Carn.* I, p. 355 (1772) e tribu *Synstylearum*.

8. **Crepis Royi**, Gdgr.

Caulibus intricatissimis, numerosis, 12-15 cent. longis intense purpurascensibus; foliis obovato-oblongis, acutis, creberrime dentatis, subtus præsertim villosis; involucri usque ad $\frac{3}{4}$ sup. pilis glanduliferis obsito.

Habitat in alpibus *Delphinatus*. — *Isère*, *Piemeyan* (J. Roy).

E grege *C. pygmeæ* L. *sp.* 1131, ut et duæ sequentes.

9. **Crepis autaretica**, Gdgr.

Caulibus sat numerosis, 9-12 cent. longis, virentibus; foliis ovatis, obtusiusculis, vix dentatis, subtus tomentosus; involucri eglanduloso.