

potius *L. microcephali* Boiss; a præcedentibus radice ad collum et fibras fere reductâ et capitulis minimis distincta.

\* \* Elatæ corymbosæ.

29. **C. rumicifolia** (Boiss. et Bal. in Bal. pl. Arm. 1866)\* glaberrima, radice crassiusculâ præmorsâ valde fibrosâ, foliis acute dentatis vel denticulatis, radicalibus obovato-oblongis obtusis basi attenuatâ sublyratâ in petiolum brevem abeuntibus, caulinis a basi rotundatâ late auriculato-amplexicauli oblongis vel oblongo-lanceolatis acuminatis, caule crasso elato superne laxe et sæpe composite corymboso pedunculis longis arcuatis, capitulis majusculis, involueri glaberrimi nigricantis phyllis externis brevissimis triangularibus interioribus linear-lanceolatis obtusis, acheniis pallidis acute sulcato-striatis vix attenuatis, pappo sordide albo fragili ȝ.

Hab. in sylvis abietinis Ponti Lazici circa Khabackar 6000' (Bal!).

Planta 4 1/2-2 1/2-pedalis, folia radicalia et caulina inferiora 4-6-pollicaria 1 1/2-2 pollices lata. Affinis *C. paludosæ* differt foliis rigidioribus, radicalibus non runcinatis, caulinorum auriculis rotundatis, capitulis majoribus, involucro non nigro-setoso; a *C. Serbicâ* Panc. cui facie accedit glabritie, phyllis non nigro-setosis distinguitur.

30. **C. Ruprechti**, radice brevi tuberiformi præmorsâ fibrillosâ, caule elato ab imâ basi folioso superne stricte ramoso 2-3-cephalo setis flexuosis basi tuberculatis eglandulosis superne crebrioribus nigris aspero, foliis tenuiter membranaceis subtus secus nervos setulosis cæterum glabris repando-denticulatis omnibus sessilibus late ovatis obtusis, radicalibus nullis infimo ad collum basi attenuato cæteris basi cordatâ late et obtuse auriculato-amplexicaulibus, supremis ad peduncularum ortum parum diminutis ovato-triangularibus, pedunculis longis, capitulis magnis, involueri livescentis phyllis dorso parce setosis obtusis latiusculis externis laxiusculis subtriplo brevioribus, acheniis (junioribus) apice attenuatis, pappo sordide albo ȝ.

Hab. in regione sylvaticâ montis Antschabala ditionis Tindal Caucasi orientalis 6000'-6600' (Rupr!). Fl. Jul.

Species insignis facie *C. Sibiricam* referens sed distinctissima radice, caule et foliis multo tenuioribus, foliorum radicalium defectu. Planta sesquipedalis, folia intermedia 3-3 1/2 pollices longa 2-2 1/2 lata, pedunculi saltem inferiores 4-5-pollicares. Prope *C. blattarioidem* collocanda ab eâ præter folia tenera et alias notas rhizomate parvo ovato-oblongo subtuberiformi non pluricipiti distincta.

31. **C. glabra**, glaberrima, radice brevi tuberiformi præmorsâ fibrillosâ, caule erecto sulcato ab imâ basi folioso superne stricte et subcomposite corymboso 3-9-cephalo, foliis membranaceis integris vel repandis omnibus sessilibus, radicalibus nullis, infimo ad collum sito oblongo basi longiuscule attenuato obtusiusculo, cæteris obtuse auri-