

potius *L. microcephali* Boiss; a præcedentibus radice ad collum et fibras fere reductâ et capitulis minimis distincta.

\* \* Elatae corymbosæ.

**29. C. rumicifolia** (Boiss. et Bal. in Bal. pl. Arm. 1866) glaberrima, radice crassiusculâ præmorsâ valde fibrosâ, foliis acute dentatis vel denticulatis, radicalibus obovato-oblongis obtusis basi attenuatâ sublyratâ in petiolum brevem abeuntibus, caulinis a basi rotundatâ late auriculato-amplexicauli oblongis vel oblongo-lanceolatis acuminatis, caule crasso elato superne laxe et sæpe composite corymboso pedunculis longis arcuatis, capitulis majusculis, involuci glaberrimi nigricantis phyllis externis brevissimis triangularibus interioribus linear-i-lanceolatis obtusis, acheniis pallidis acute sulcato-striatis vix attenuatis, pappo sordide albo fragili ♀.

Hab. in sylvis abietinis Ponti Lazici circa Khabackar 6000' (Bal!).

Planta  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ -pedalis, folia radicalia et caulinaria inferiora 4-6-pollicaria  $1\frac{1}{2}$ -2 pollices lata. Affinis *C. paludosæ* differt foliis rigidioribus, radicalibus non runcinatis, caulinorum auriculis rotundatis, capitulis majoribus, involucro non nigro-setoso; a *C. Serbicâ* Panc. cui facie accedit glabritie, phyllis non nigro-setosis distinguitur.

**30. C. Ruprechti**, radice brevi tuberiformi præmorsâ fibrillosâ, caule elato ab imâ basi folioso superne stricte ramoso 2-3-cephalo setis flexuosis basi tuberculatis eglandulosis superne crebrioribus nigris aspero, foliis tenuiter membranaceis subtus secus nervos setulosis cæterum glabris repando-denticulatis omnibus sessilibus late ovatis obtusis, radicalibus nullis infimo ad collum basi attenuato cæteris basi cordatâ late et obtuse auriculato-amplexicaulibus, supremis ad peduncularum ortum parum diminutis ovato-triangularibus, pedunculis longis, capitulis magnis, involuci livescentis phyllis dorso parce setosis obtusis latiusculis externis laxiusculis subtriplo brevioribus, acheniis (junioribus) apice attenuatis, pappo sordide albo ♀.

Hab. in regione sylvaticâ montis Antschabala ditionis Tindal Caucasi orientalis 6000-6600' (Rupr!). Fl. Jul.

Species insignis facie *C. Sibiricam* referens sed distinctissima radice, caule et foliis multo tenuioribus, foliorum radicalium defectu. Planta sesquipedalis, folia intermedia 3-3 $\frac{1}{2}$  pollices longa 2-2 $\frac{1}{2}$  lata, pedunculi saltem inferiores 4-5-pollicares. Prope *C. blattarioidem* collocanda ab ea præter folia tenera et alias notas rhizomate parvo ovato-oblongo subtuberiformi non pluricipiti distincta.

**31. C. glabra**, glaberrima, radice brevi tuberiformi præmorsâ fibrillosâ, caule erecto sulcato ab imâ basi folioso superne stricte et subcomposite corymboso 3-9-cephalo, foliis membranaceis integris vel repandis omnibus sessilibus, radicalibus nullis, infimo ad collum sito oblongo basi longiuscule attenuato obtusiusculo, cæteris obtuse auri-