

Planta spontanea a culta valde diversa. Spontanea sesquipedalis hispida, culta bipedalis et ultra fere glabra. Calyx in spontanea hirtus, in culta fere glaber, excluso exteriori. Flores minores quam in *C. tectorum*. W.

*24. CREPIS biennis.

C. foliis hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis carina hispido-aculeatis, calycibus pubescentibus muricatis. W.

C. foliis runcinato-pinnatifidis scabris: basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Fl. suec. 2. p. 706.*
Sort. ingr. 125. Pollich. pal. n. 752. Hoffm. germ. 281. Roth. germ. I. 336. II. 254.

C. foliis subscabris, semipinnatis, pinna extrema maxima. *Hall: helv. n. 30.*

C. scanensis. It. scan. 171.

Hieracium maximum, chondrillae folio, asperum. *Bauh. pin. 127. prodr. 64. Raj. angl. 3. p. 166.*

Hieracium, erucæ folio, hirsutum. *Bauh. hist. 2. p. 1025. bene.*

Hieracioides altissima annua, chondrillae folio, flore utrinque luteo. *Vaill. act. 1718.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 96.

Zweijähriger Pippau. W.

Habitat in Scaniae et Eüropae australioris pratis. ♂
(v. v.)

Calyx calyculatus, sulcatus, muricatus longitudinaliter aculeis mollibus. Folia omnia lyrato-pinnata, subtus hispida. Caulis angulatus, scaber, altitudine fere humana vel quadripedalis, fragilis.

*25. CREPIS scabra. W.

C. foliis runcinatis hispidis, caulinis sessilibus, floribus corymbosis, calycibus tomentosis exterioribus adpressis. W.

Rauhblättriger Pippau. W.

Habitat in Gallia. (v. f.)

Caulis striatus simplex pedalis pilis brevissimis parce obsitus. Folia radicalia valde hirta obovato-runcinata, laciniis obtusis subdentatis, petiolata bipollicaria; caulina lanceolata runcinata minus hispida sessilia, laciniis infimis parum elongatis; summa floralia
Linn. Sp. Pl. Tom. III. P. III.

lineari - subulata basi subhastata, auriculis filiformibus. Flores magnitudine C. tectorum corymbosi. Pedunculi albi tomentosi. Calyces tomentosi non muricati. Calyculo adpresso. Similis C. bienni sed folia radicalia obovato-runcinata, Pedunculi et Calyces tomentosi, calyculusque adpressus. Sub nomine C. Dioscoridis accepi, sed ab hac diversissima. W.

*26. CREPIS pinnatifida. W.

C. foliis glabris sessilibus lanceolatis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis, caule erecto ramoso, calycibus pubescentibus. W.

Crepis virens. Hoffm. germ. 281. Roth. germ. I. 336. II. 254. Allion. ped. n. 805.

Schlitzblättriger Pippau. W.

Habitat in cultis et agrorum marginibus Germaniae, Italiae. ☉ (v. v.)

Abunde a sequenti foliis pectinato-pinnatifidis apice integerrimis et caule erecto diversa, cui respectu floris similis. W.

27. CREPIS virens.

C. foliis glabris inferioribus remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso, calycibus pubescentibus. W.

C. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subtomentosis. Sp. pl. 1134. Villars delph. 3. p. 142.

Crepis Dioscoridis. Roth. germ. II. 255?

C. caule ramosissimo, foliis glaberrimis teneris, integris et dentatis. Hall. helv. n. 33.

Lapsana capillaris. Sp. pl. 1. p. 812. Gouan. monsp. 418.

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus. Bauh. pin. 127. prodr. 63.

Hieracium minus Dioscoridis. Tabern. 181. Hall. R.

Hieracium dentis leonis folio hirsutum, flore luteo extus purpurascente. Tournef. paris. 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 96.

Grüner Pippau. W.

Habitat in Helvetiae, Galliae agris. ☉ (v. f.)

Folia Radicalia lanceolata, obtusa, glabra, subdentata; Caulina lanceolata, hastata, subamplexicaulia, integerrima, acuta, parva. Caules spithamaei, erecti,