

493. L. stricta. Pl. rar. Hung. I. t. 48. (1801)

In silvis et fruticetis Bndae, Agriæ, ad Párad, in Syrmio, ad Csákvár.

494. L. Scariola L. virosa Pollini (1790) p. 13. (1801)

Missa a Szontágh sub no: 6.

495. L. sagittata. Pl. rar. Hung. I. t. 1. (1801)

Habitat in silvis et fruticetis Hungariae, Slavoniae, Croatiae. (In umbrosis ad Gödöllő lecta; tota pallida erat.)

496. Crepis rigida. Pl. rar. Hung. I. t. 19. (1801)

In montibus Budensibus, Tokayino.

497. C. foetida. Pl. rar. Hung. I. t. 20. (1801)

In aggeribus per calidorem Hungariam, Slavoniam, Croatiam,

498. C. seepusiensis mihi. (1801)

Radix ramosa, fusca. Caulis sesqui-, raro 3-pedalis, eretus, enlatum tritici crassitie aequans aut parum superans, fistulosus, sulcato-angulatus, inferiore parte pilis adspersus, superne aut etiam glaber, laevis, ex omnibus foliorum axillis, etiam infimis, ima et parte radiei proxima nonnumquam, ramos edens erectos, iterum, ut apex caulis, divisos in plures tenues erectos pedunculos. Folia radicalia brancinata, subhispida; caulinata remota, indivisa, obtusiuscula, remotissime denticulata, supra subnuda, aut pilis raris adspersa, subtus pluribus, praesertim rachi obsita, oblonga, inferiora versus basin angustata, infimum non raro petiolatum, reliqua sessilia, superiora lanceolata, acutiuscula, integriformia, ramea linearia, dein subulato-linearia. Flores paniculati, duplo minores quam in bienni, erecti, in pedunculis vi pollicaribus, 2—3-pollicaribus, tenuibus, glabris, foliolo linearis subulato instratis aut aphyllis. Calyx ante evolutionem subtomentosus demum calvescens, squamis linearibus, exterioribus duplo brevioribus. Corollæ luteæ. Pappus pilosus sessilis.