

- β. *runcinata* (Frœl.) mss. scapo 1-cephalo, foliis runcinato-pinnatifidis. (v. v. s. in Alp. Algov.)
- γ. *taraxaciformis* (Frœl. mss.), scapo monocephalo humili crassiusculo, capitulo tumido glabriusculo, foliis spathulatis dentatis sessilibus. (v. v. in Taureno Ranviciensi in confinibus Salisburgiæ et Carinthiæ supra glacies æternas). An propria species? Flos magnitudine et formâ Taraxaci Dentis-leonis, etc., sed croceus, scapus vix bipollicaris crassiusculus ascendens, folia obovato-oblonga vix petiolata, capitulum ovatum crassiusculum.
- δ. *leiocephala* (Frœl. mss.), scapo sub-2-cephalo, involucrio glabro. (v. v. in Alp. Algov.)
- ι. *Halleriana* (Frœl. mss.), scapo diviso dicephalo. Taraxacum calycibus hirsutis squamis rectis Hall. hist. n. 57. t. 1. bon. (v. v. cum priore.)
- ζ. *crocea* (Frœl. mss.), foliis runcinatis utrinque glabris, caule paucifolio ramoso, ramis longis nudis unifloris calycibus villosis nigrescentibus. — Scapus 3-4-cephalus subfoliatus: pedunculis elongatis laxiusculis. Flos croceus. Involucri figura et indumentum idem ac in typo. Vix propria species et syn. Gmel. potiùs H. alpestri Jacq. adscribendum, cum auctor ipse flores flavos prædicat. (v. v. in Taureno Ranvic.) (1).
37. *C. KITABELII* (Frœl. mss.), scapo 1-cephalo aphylo foliisque glabris, primordialibus integris linearibus, secundariis lanceolatis acutis subruncinato-dentatis, involucrio glabriusculo (flor. flavis). ♀ in Alpibus Croatiæ. Hieracium Alpinum Willd. herb. 14635! n. A! Nimis affinis H. Alpino à quo differt, monente cl. Kitabelio in litt., flore dimidiò minore constanter flavo, involucrio ferè glabro basi tantùm pilis raris articlatis adperso, squamis multò angustioribus linearibus, foliis multò minoribus longè petiolatis. (v. s. sp. comm. à cl. Kit.)
38. *C. HETEROTRICHA* (DC. herb.), acaulis, foliis radicalibus lineari-oblongis acuminatis in petiolum attenuatis semipinnatifidis, lobis remotis acuminatis pilis rigidis eglandulosis hirtellis, scapo foliis triplò longiore 1-cephalo scabro, pilis ad apicem et ad involucrium rigidis glanduliferis, invol. imbricato corollis longiore. ♀ in Oriente ad Alpes Zerokou dictas legit cl. Aucher-Eloy! Hieracium glandulosum Auch. pl. exs. n. 3549 non Schult. Achaënia glabra lævia. Pappus albus multiserialis. Ligulæ flavæ invol. breviores. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
39. *C. ARMENA* (DC. herb.), acaulis breviter glanduloso-pubescentis, foliis radicalibus obovatis oblongisve in petiolum attenuatis acutè inciso-dentatis, scapo nudo aut foliolum lineare integerrimum gerente 1-cephalo, invol. squamis lanceolato-linearibus acuminatis circ. biseriatis. ♀ in Armeniâ legit cl. Aucher pl. exs. n. 3280! Herba 3-pollicaris Leontodontis facie. (DC. v. s. comm. à cl. inv.)
40. *C. ? SIMPLEX* (Frœl. in litt. 1837), scapo 1-cephalo aphylo supernè incrassato squamoso, involucrio simplici cylindraceo, foliis spathulatis sinuato-dentatis. ♀? in pratis propè Cyrenam Africae bor. Hieracium simplex Viv. fl. libyæ. et in bot. zeit. 1825. p. 636. non Lapeyr. Plantam à me non visam huc refero cum auctor fructus subrostratos indicat. An potiùs Barkhansia species? †.
41. *C. SCHREBERI* (Frœl. in litt. 1837), scapo submonocephalo subunifolio, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis linearibus subdentatis mucronatis, involucrio simplici usculo cano-tomentoso hirsuto. ♀? . . . Hierac. Gmelini Schreb. herb. Habitu affinis H. alpestri Jacq. à quo differt radicis capite albo-villoso, involucrio imbricato nec squamis majoribus obvallato, foliorum laciniis dentibusque mucrone albo acuminato terminatis. (v. s. in herb. Schreb.)

(1) Sub nomine Hier. crocei recepi à cl. Turczaninow stirpem in lapidosis Transbaicalensibus et arenosis Mongolicis crescentem, variantem caule simplici aut ramoso 1- aut polycephalo, pilis invol. albidis aut nigris. Mihi videtur species propria nempe Hier. croceum Lam. dict. 2. p. 360. Willd. sp. 3. p. 1571. Gmel. fl. sib. a. p. 22. t. 8. f. 1. (DC. v. s.)