

anderes Mal sind die Blätter 3 — 6 Zoll und darüber lang und kommen der Hälfte oder zwei Dritttheilen der Schaftlänge gleich, und manchmal trifft man sogar Stöcke an, deren Schäfte nicht länger als die Blätter oder sogar kürzer als diese sind. Die wichtigsten Abänderungen sind jedoch die der randständigen Früchte, nach deren verschiedenen Beschaffenheit sich 2 bemerkenswerthe Spielarten ergeben:

α. *alata*, der geflügelte; *fructibus marginalibus*  
**3 — 5alatis.** — *Lagoseris nemausensis* Koch, Synops. ed. 1. p. 435.

β. *aptera*, der flügellose; *fructibus marginalibus*  
*exalatis.* — *Lagoseris nemausensis* M. Bieb. Flor. taur. cauc. III. p. 538. *L. bifida* Koch, Synops. ed. 1. p. 435. *Trichocrepis bifida* Visian. Stirp. dalmat. p. 18. t. 7. *Crepinia Marschalliana* Reichenb. Flor. exc. germ. p. 269. no. 4786. *Pterotheca bifida* Fisch. et Mey. Ind. IV. sem. h. petropol. p. 43. Ledeb. Flor. ross. II. p. 831.

Zwischen diesen beiden Varietäten lässt sich durchaus kein Unterschied im Bau der übrigen Theile nachweisen.

**Vorkommen.** Auf Brachäckern und an unfruchtbaren, uncultivirten Stellen. Für unser Florengebiet sind bis jetzt nur zwei Standorte mit Sicherheit bekannt, nämlich in *Istrien* bei *Dignano* (Tommasini) und *Fiume* (Noë). — Mai, Juni. ☉.

Der weitere Verbreitungsbezirk erstreckt sich vom südlichen *Frankreich* über *Piemont*, *Italien*, *Dalmatien* und *Griechenland* bis zum südlichen *Russland*, den Ländern des *Caucasus* und dem südlichen *Sibirien*, sodann über die Inseln des *mittelländischen Meeres* und *Kleinasien* bis nach *Syrien*, *Palästina* und dem *steinigen Arabien*.

## 29. *Crepis* Gärtn. Pippau.

Gärtn. de Fruct. II. p. 364. t. 158. f. 8. *Crepidid*, *Hieracii*, *Leontodontis* et *Hypochaeridis* spec. Linn. Spec. pl. *Crepidid* spec. et *Barkhausia* Mönch. meth. plant. *Crepis* et *Barkhausia* Tausch, in Flora 1828, I. Ergänzgsbl. p. 77. u. 80. *Barkhausia* et *Crepis* Less. Synops. Compos. p. 136. *Barkhausia*, *Paleya*, *Anisoderis*, *Aetheorhiza*, *Crepis*, *Phaecasium*, *Brachyderea*, *Intybellia* et *Omaloclina* Cassin. in Dict. sc. nat. *Barkhausia*, *Crepis* [excl. *C. hispidissima*] et *Geracii* spec. Reichenb. Flor. germ. exc.

*Involucrum* biseriale, foliolis exterioribus brevioribus, v. subimbricatum; foliolis interioribus carinatis. *Fructus* subconformes, teretiusculi v. subprismatici, saepe compressiusculi, 10 — 30 costati, apice attenuati v. bre-

\*\* Capitula ante anthesin erecta.

3. *C. taraxacifolia* Thuill., involucri foliolis exterioribus glabriusculis bracteisque herbaceis margine anguste membranaceis.
4. *C. vesicaria* L., involucri foliolis exterioribus bracteisque scariosis concavis.
5. *C. setosa* Hall fil., involucri foliolis omnibus hispido-setosis, bracteis herbaceis setoso-ciliatis.
  - b. Fructus erostrati v. tantummodo breviter et obsolete rostrati. (Sect. II. **Alethrocrepis**):
6. *C. biennis* L., foliis caulinis planis basi auriculato-dentatis, involucri foliolis facie interiore sericeo-pubescentibus, fructibus apice paulum tenuioribus, anthoclinio glabro.
7. *C. nicaeensis* Balb., fol. caulinis planis basi hastatis, involucri foliolis dorso glanduloso-hirsutis facie interiore glabris, fructibus apice paulum tenuioribus, anthoclinio pubescente.
8. *C. tectorum* L., fol. caulinis superioribus margine revolutis basi hastatis, involucri foliolis facie interiore pubescentibus, fructibus apice valde attenuatis, anthoclinio breviter setuloso.
9. *C. virens* L., fol. caulinis planis basi sagittatis hastatisve, involucri foliolis dorso pubescentibus facie interiore glabris, fructibus apice paulum attenuatis, anthoclinio glabro.
10. *C. neglecta* L., fol. caulinis planis basi sagittatis v. hastatis saepeque pectinato-pinnatifidis, involucri foliolis facie interiore glabris, fructibus rostrato-attenuatis, anthoclinio puberulo.
11. *C. pulchra* L., fol. caulinis planis basi truncatis, involucri foliolis facie interiore glabris, exterioribus brevissimis adpressis, fructibus apice paulum attenuatis, anthoclinio glabro.

## B. Species perennes.

- a. Caulis sapiformis, aphyllus v. rarius inferne unifolius (Sect. III. **Intybus**).
  12. *C. praemorsa* Tausch., scapo racemoso, fructibus erostratis.