

SCORZONERA L. gen. Scorzonera,

După *Sc. hispanica* L. sp.

S. stricta Horn. H. Havn. II, 1815, 750. (**S. taurica** Janka in Linn. XXX, 587, non M.B. ex ipso Janka Közlem. XII, 180.) S. strictă. Planta pubescentă. Tulpina erectă, foliată, cu mai multă mai puțină capitulă. Foile inferioare îngustă-lanceolate, de totușă întregi, cele superioare lineară-subulate. Involucrul oblong, *foliole acuminatae, pre margini subtomentose*, cele exterioare ovate, mai scurte, cele interioare elongate, oblongi. Florile galbene.

Prin fenele mai macre în reg. inferioră.

Observare. După Ledeb. Fl. Ross. II, 795, diferă de **S. taurica** M.B. numai prin foile mai înguste.

Totușă acolo se dice, că *S. taurica* M.B. e specie distinctă de *S. hispanica* L. sp.?

PODOSPERMUM DC. Fl. Fr. Podospermū.

Observare la **P. Jacquinianum** Koch. Simonkai in En. Fl. Tr. 356, dice că relativ la această plantă provină în una și aceeași localitate specimene parte cu fasciculi sterili de foii și parte fără atari fasciculi, prin urmare indică planta transilvană sub numirea:

P. canum C.A. Meyer Verz. Cauc. 1831, 62. (*Scorzonera octangularis* Bmgt: Tr. III, 12, non Willd. Spec. III, 1800, 1506. — **P. Jacquinianum** Koch Syn. — **P. heterophyllum** et **P. calcitrapifolium** Schur En. Tr. 364, non C. Koch in DC.)

Pre locuri erbouse în reg. inferioră. În partea nordică a Transilvaniei nu provine.

Var. **P. integrifolium** Schur En. Tr. 364. (*Scorzonera angustifolia* Bmgt. Tr. III, 11, non L. sp. — **Galasia villosa** Aut. Tr. non Cass.) Foile totușă întregi și lineare.

Totușă pre aceleasi localitati.

CREPIS L. gen. Crepide. Vulg. Sunătore.

A se adăuga la *C. setosa* Hall.

Var. **C. glabrata** Porcius Distr. Năs. Diferă de forma tipică prin pedunculi și involucrul glabri (nu subspinulos-hispida). Lângă căi, prin islazuri erbouse, printre și la margini de semenături.