

4 мм. шир., листочки покрывала голые или рассеянно-железистые, наружные треугольные, внутренние линейно-ланцетные, узко-окаймленные. Листья цельные, стеблеобъемлющие, обратно яйцевидные или широко-ланцетные, тупо зубчатые, реже нижние б. или м. глубоко-перисто-надрезанные с тупыми долями. Стебли 30—60 см. выс. Дв.—Гр.: Тиф. (сю) Аз.: Карабах Ар.: Эр. Лори Тур.: Ольт. о. В средней горной зоне по опушкам, в кустарниках.

○ 5470. *C. confertus* Conrath et Freyn

Соцветие б. или м. густо железисто-пушистое, обычно большое, рыхло-метельчатое с большим числом корзинок. Корзинки цилиндрические, 5—6 мм. шир. Покрывало рассеянно-железистое, реже голое; листочки его ланцетные, внутренние линейные. Листья голые, тонкие, почти лировидно-перисто-рассеченные, с более крупным треугольно-сердцевидным верхним сегментом, верхние листья уменьшенные, линейно-ланцетные. Стебли 60—100 см. выс. Дв.—Сев.: Чрн. Гр.: Тиф. (ю) Аз.: Ган. (ю). В средней горной зоне по опушкам лесов и в кустарниках.

5471. *C. hispidus* (MB.) Boiss.

(=*Prenanthes hispidus* MB. = *Lactuca microcephala* DC.)

Род 1022. REICHARDIA Roth-

Корзинки многоцветковые. Покрывало черепичатое. Цветоложе голое. Цветки желтые. Семянки двоякого рода; наружные 4—5-гранные, 4—5 бороздчатые, попеременно морщинистые, внутренние от основания постепенно утонченные, почти конические и гладкие. Внутренние волоски летучки более длинные и крепкие. Травы.

(Из 8 видов, заселяющих Канарские острова, страны Средиземья, запад. и центр Азии до Индии, у нас 1.)

Выс. 40—80 см., голое. Стебли прямые, вверх ветвистые, с удлиненными ветвями, несущими на конце одиночные корзинки. Листья сизые, нижние широко линейно-лопаччатые, по краю курчаво-волосистые. Корзинки около 15 мм. шир. Листочки покрывала голые, узко-бело-окаймленные, наружные треугольные, островатые, внутренние продолговато-ланцетные, тупые. Язычки ярко-желтые. Семянки удлинённые, четырехгранные с четырьмя бороздками, по ребрам бугорчато-зубчатые, внутренние гладкие, М.—Сев.: Тер. Даг. Гр.: Бат. Тиф. (сю) Аз.: Ган. (сю) Бак. (с) Ар.: Лори Эр. Нах. Тур.: Артв. о. В средней горной зоне на сухих щебнистых и каменистых местах.

5472. *R. dichotoma* (MB.) Roth

Род 1023. CREPIS L.—СКЕРДА

Корзинки многоцветковые. Покрывало при основании с мелкими листочками. Цветоложе голое или коротко волосистое. Семянки обычно одинаковые, цилиндрические или почти призматические, иногда слегка сжатые, 10—30 бороздчатые, к вершине суженные или с носиком; редко краевые семянки отличаются от внутренних. Хохолок из мягких белых волосков. Травы.

(Из 200 видов, населяющих умеренные зоны Сев. полушария, а также Южн. Америку, южн. и тропическую Африку, у нас 22.)

1. Внутренние семянки с длинным носиком 2.

Семянки без носика,верху суженные 5.

2. Корзинки до цветения поникающие, 8—12 мм. шир. Листочки покрывала серовато-пушистые и щетинистые, наружные ланцетные, внут-

корзинок длинные. Корзинки крупные. Листочки покрывала темноватые, по спинке рассеянно щетиниотые, тупые, довольно широкие. М.—Даг. В средней горной зоне в лесах.

○ 5486. *C. Ruprechtii* Boiss.

Совершенно голые, реже железистые растения. Совокупность остальных признаков иная 16.

16. Прикорневые листья обратно-яйцевидно-продолговатые, тупые, к основанию утолщенные, почти лировидные, стеблевые из широко стеблеобъемлющего основания продолговатые или продолговато-ланцетные, заостренные. Стебли выс. 40—70 см. Метелка рыхло ветвистая; ножки корзинок длинные, изогнутые. Корзинки довольно крупные; листочки покрывала голые, черноватые, внутренние линейно-ланцетные, тупые. Семянки бледные. М.—Сев.: Куб. Абх. Гр.: Кут. (с) Тиф. (с). В верхней лесной зоне.

5487. *C. rumicifolia* Boiss. et Val.

○ *V. glandulosa* Alb.—Листочки покрывала по спинке густо усажены длинными железистыми волосками.—Сев.: Чрн.

Прикорневых листьев нет. Листья слегка перепончатые, нижние продолговатые, тупые, суженные в черешок, остальные сидячие, стеблеобъемлющие, продолговатые или ланцетные, островатые. Метелка небольшая с длинными ножками корзинок. Корзинки 10 мм. шир. Листочки покрывала черные, туповатые, внутренние линейные. Стебли выс. 30—60 см. М.—Сев.: Куб. Тер. Даг. Гр.: Кут. (с) Тиф. (с). В субальпийской и альпийской зоне на лугах.

○ 5488. *C. caucasica* C. A. M.

(=*C. glabra* Boiss. = *Hieracium georgicum* Fr.)

17. Летучка состоит из серых ломких волосков. Стебель толстый, высокий, 1—1,5 м. выс. Листья мягко-шероховатые, крупные, яйцевидно-продолговатые, нижние суженные в крылатый, стеблеобъемлющий черешок, средние сидячие с сердцевидно-стеблеобъемлющим основанием, верхние ланцетные. Корзинки немногочисленные, крупные, 10—13 мм. шир. Листочки покрывала темно-зеленые, продолговато-ланцетные, по спинке шероховато-пушистые. Семянки гладкие, с 25—30 ребрышками с каждой стороны. М.—Сев.: Куб. Тер. Абх. Гр.: Тиф. (сю) Аз.: Бак. (с) Ар.: Лори Эр. До средней горной зоны в лесах и между кустарниками

5489. *C. sibirica* L.

○ *V. hispidissima* D. Sosn.—Все растение, а особенно ножки корзинок и листочки покрывала, густо пушистые.—Гр.: Тиф. (ю) Ар.: Эр.

Хохолок состоит из мягких белых волосков 18.

18. Корзинки довольно мелкие, 5—7 мм. шир., многочисленные, в продолговатом, реже щиткообразном, метельчатом соцветии. Листочки покрывала серовато-шерстистые, наружные линейно-ланцетные, отстоящие, почти в 4 раза короче внутренних. Семянки сверху суженные, с 20 ребрышками. Листья жесткие, линейно-продолговатые, крупно-зубчатые, суженные в черешок, стеблевые сидячие, яйцевидные, верхние ланцетные, все остро-зубчатые и мелко-шероховато-пушистые. Стебель 40—100 см. выс., прямой. М.—Сев.: Ствр. Куб. Тер. Чрн. Гр.: Тиф. (сю) Аз.: Ган. (сю) Бак. (с) Карабах Ар.: Лори Эр. Нах. До средней горной зоны на степных склонах.

5490. *C. rannonica* (Jacq.) C. Koch

(=*C. rigida* W. K.)