

terove lineari integro, pedunculis elongatis glabris nudis, capitulis mediocribus, calyculi squamis triangulari-lanceolatis acutis albomarginatis involucre quadruplò brevioribus, involucri glabri phyllis angustè linearibus floriferis livescentibus angustè albomarginatis fructiferis dorso ad tertiam vel dimidiam partem usquè secùs nervum medium elevatum rotundato-carinatum spongiosè incrassatis, ligulis luteis concoloribus involucre sesquolongioribus, acheniis cylindricis rectis sub 45 striatis supernè vix attenuatis pappo niveo demùm deciduo eis paulò longiori coronatis.

Hab. in montanis dumosis Anatoliæ, *Smyrnæ* in montibus suprâ *Siclar* (Boiss.), in fauce *Tsimboukkan* Pamphyliæ (Heldr.), in Antilibano circâ *Rascheya* (Boiss.).

Folia 3-5 pollic. longa 6-8 lin. lata illa *Aposeridis foetidæ* quodammodò referentia, caulibus 4-4 1/2 pedales, capitula magnit. ferè *Cr. Sieberi*. Huic et duabus præcedentibus affinis sed distinctissima foliis indumento viscidulo obsitis, segmentis omnibus acutis non dentatis, caulibus subnullis vel angustè linearibus, phyllis non ut in eis fructiferis immutatis sed secùs nervum medium ut in *Phæcasio* et *Cymboseride* spongioso-incrassatis.

Var.  $\beta$ . — Pedunculi supernè involucreque pubescenti-viscida.

Hab. in regione mediâ Hermonis suprâ *Rascheya* et *Gebel Baruck* Libani. Legi Aug.

### CREPIS SIBTHORPIANA Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

*Cr.* rhizomate nudo indurato ramoso cæspitoso, foliis ferè omnibus radicalibus breviter puberulis obtusiusculis rariùs acutis oblongo-lanceolatis dentatis vel runcinato-pinnatifidis segmentis triangularibus acutis retrorsis terminali paulò majori triangulari acuto, caulibus nanis puberulis striatis rigidis crassiusculis folia paulò superantibus supernè alternatim 2-4 cephalis ad pedunculorum insertionem infracto-flexuosis, pedunculis ferè horizontalibus crassis capitulo subbrevioribus basi foliolo lineari-setaceo suffultis, calyculi squamis adpressiusculis linearibus involucre albo tomentello triplò brevioribus, phyllis latiusculè elliptico-linearibus obtusiusculis secùs lineam mediam nigrescentibus margine albo-membranaceis, ligulis subtus rubellis, acheniis sub 42 striatis cylindricis rectis basi et apice obsolete attenuatis pappo niveo eis æquilongo superatis.

*Cr. divaricata* var. *canescens* pl. Cret. exs. 1847. — *Hieracium foetidum* Fl. græc. tab. 799 non Willd.

Hab. in saxosis montium Sphacioticorum Cretæ in monte *Stravopodia* (Heldr.) alt. 6000' (Sibth.).

Planta 3-5 pollic., folia 2-4 poll. circ. longa infima minùs profundè dentata, caules supernè ad pedunculos alternos eximiè angulato-flexuosi, pedunculi crassi 3-4 lin. longi, capitula magnit. eorum *Cr. Nicæensis*. Primùm retuleramus ad nostram *Cr. divaricatam* quæ accuratius comparata differt foliis longioribus profundius et acutius pinnatis præsertim caulibus divaricato-ramosissimis, pedunculis 1-2 pollices longis, involucri phyllis angustioribus parcè puberulis apice magis attenuatis. *Hier. foetidum* Willd. — *Crepis foetens* Frœlich in DC. Prodr. exs. planta Armena diversissima.

CREPIS MACROPUS Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

*C.* rhizomate crassiusculo nudo, collo squamoso, foliis radicalibus ad costam parcissimè hirsutis petiolatis runcinato-pinnatipartitis acuminatis segmentis omnibus retrorsis lanceolatis acutis integris vel denticulatis, caulibus puberulis simplicibus vel ad medium semel vel bis bifurcis 1-4 cephalis, foliis ad dichotomias angustè linearibus integris, pedunculis longis rectis squamulis setaceis paucis obsitis, capitulis mediocribus, calyculi squamis lineari-lanceolatis numerosis inæqualibus adpressis, involucri phyllis densè farinoso-tomentosis lanceolato-linearibus acutiusculis, ligulis flavis concoloribus involucri sesquilonioribus, acheniis sub 12 striatis cylindricis rectis apice vix attenuatis pappo niveo eis longiori superatis.

*Cr. divaricata* var. *longipes* pl. Heldr. Anat. exs. 1846.

Hab. in collibus aridis Lycaoniæ ad occidentem urbis *Koniah Beycheher* versus. (Heldr.)

Planta 8-9 poll. longa, folia bipollicaria, pedunculi 3-4 poll. longi, capitula paulò majora eis *Cr. divaricatæ* et præcedentis a quibus differt foliorum segmentis longioribus, pedunculis longissimis, involucri valdè farinaceo-tomentoso, calyculi squamis numerosioribus.

CREPIS ATHOA Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

*C.* perennis, rhizomate cæspitoso, collo valdè squamoso, foliis radicalibus lanceolatis acutis in petiolum setulosum longè et angustè atte-