

triplò breviori, involuci phyllis conniventibus linear-lanceolatis obtusiusculis brevissimè setulis albis nigrisque hirtellis, ligulis luteis concoloribus involucra paulò superantibus.

Hab. in arenosis *Arabiæ petreæ* Palæstinam versus. Legi Apr. 1846.

Folia 1-1 1/2 poll. longa, caules 3-4 pollicares, capitula illis Sp. præcedentis majora, involuci phylla 5 lin. circ. longa. A præcedenti distincta foliis abbreviatis, caulibus ramosioribus apice glandulosis, involucro densiusculè hirto. Habitus *Lagoseridis Nemausensis*.

CREPIS CRETICA Boiss. (Sect. *Barckhausia*.)

Cr. annua breviter hirtula, foliis omnibus radicalibus obovatis obsoletè denticulatis vel pinnatifidis, caulibus numerosis setaceo-filiformibus ascendentibus simplicibus vel parcè ramosis glabris, capitulis minimis longiusculè pedunculatis, involuci squamis accessoriis 3-4 brevissimis setaceis, phyllis glabris vel dorso setulosis fructiferis patulis subinduratis canaliculatis dorso obtusè carinatis, achenis oblongo-lanceolatis striatis apice in rostrum eis duplò breviùs attenuatis, pappo valdè deciduo achenio breviori.

Hab. in *Cretâ* undè retulit cl. Prof. Raulin.

Barckausia Cretica Boiss. in Raulin pl. Cret. exs.

Plantula 2-3 pollicaris, capitula eis *B. cernuæ* ferè minora, involuci phylla vix ultrà 2 lin, longa. A *B. cernuâ* achenis rostratis, a *B. leo todontoide* Rchb, foliis non elongatis, caulibus brevissimis achenis dimidiò brevioribus distincta. *B. Suffreniana* rostro achenium æquanti, *B. bellidifolia* caulis crassioribus capitulis plus duplò majoribus differunt. Species ex duobus speciminibus tantum nota ulterius investiganda.

CREPIS SIEBERI Boiss. (Sect. *Eucrepis* DC.)

Cr. perennis, radicis præmorsæ fibris cylindricis tenuibus elongatis, collo lanâ rufescenti vestito, caule parcè pilosulo glabrovo supernè laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus sub lente secus costam densius in utrâque paginâ parcè setulosis radicalibus inferioribusque petiolatis interruptè lyrato-pinnatipartitis lobis laterilibus numerosis a superioribus ovatis angulatis subretrorsis ad infimos triangulares sensim diminutis terminali majori basi truncato vel subcordato-ovato acutiusculo obsoletè dentato, folio caulino ad ramum in-

feriorem sito sublyrato basi amplexicauli cæteris linearibus integris brevibus, ramis pedunculisque glanduloso-pubescentibus, calyculi squamis adpressis triangulari-lanceolatis involucro quadruplò brevioribus, involuci puberuli phyllis linearibus uniserialibus acutis angustè albo-marginatis, ligulis intensè flavis concoloribus involucro duplò longioribus, acheniis angulatis sub 15 nerviis apice subattenuatis, pappo niveo deciduo achenii longitudinis.

Crepis interrupta Sieb. pl. Cret. exs. DC. Prodr. non Sibth. Flora Græca.

Hab. in rupestribus Atticæ, Argolidis, Laconia (Boiss. Sprun.), Cretæ (Sieb. Heldr.), Zacynthi (Margot.), insulæ Cos (d'Urv.).

Species pulchra toto coelo diversissima a verâ *Cr. interrupta* Sibth. tab. 308 quæ *Barckhausiam Zacynthiam* DC. sistit.

CREPIS HIEROSOLYMITANA Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis, radicis præmorsæ fibris longis tenuibus cylindricis collo glabro, caule imâ basi setuloso cæterùm glabro supernè laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus ad rachidem subtus parcè setulosis cæterùm glabris radicalibus petiolatis lyrato-pinnatipartitis rachide alatâ integrâ segmentis lateralibus numerosis ovato-rotundis subintegris obtusis a superioribus ad infima diminutis terminali a basi subcordatâ ovato-oblongo obtuso subrepando, foliis caulinis inferioribus 1-2 lyratis basi dilatatâ amplexicaulibus rotundato-auriculatis, rameis linearibus abbreviatis, pedunculis glabris vel sub lente crispulè et minutissimè puberulis, calyculi squamis lanceolatis acuminatis laxiusculis involucro triplò brevioribus, involuci subfarinoso-puberuli phyllis lanceolatis angustè albo-marginatis acutis, ligulis concoloribus involucro duplò longioribus, acheniis subincurvis angulatis sub 14 nerviis supernè subattenuatis, pappo niveo citò deciduo acheniis longiori.

Hab. in rupestribus colium circà Hierosolymam sitorum v. gr. in rupibus ad meridiem vallis Hinnom. Legi April.

Pedalis vel sesquipedalis, folia radicalia 3-4 poll. longa segmenta lateralia 4-6 diametro 3-4 lin. lata, terminale pollicem circ. longum, panicula et capitula *C. Sieberi* cui habitu et characteribus valdè affinis est et a quâ differt radicis collo non lanato, foliorum segmentis omnibus obtusis ferè integris rotundatis, calyculi squamis longioribus