

** *Scapo polycephalo.*

42. *C. SILENIFOLIA* (Frœl. mss.), scapo subaphyllo polycephalo subpaniculato foliisque oblongo-obovatis subintegerrimis hirsutis, involucris ovatis laxiusculis glanduloso-hirtis. \mathcal{L} . . . Scapus vix spithamalis rigidulus supra medium in pedunculos 3-4 alternos subfastigiatis divisus subaphyllus. Folia coriacea subtus glauca elliptico-obovata petiolata. Involucrum pilis albis longiusculis articulis basi incrassatis apice glanduliferis intermixto tomento albo vestitum. (v. s. in herb. Vahl.)

*** *Caule folioso.*

43. *C. SALICIFOLIA* (Frœl. mss.), caule stricto folioso corymboso oligocephalo, foliisque lanceolatis denticulatis subtus glaucis glabris, caulinis sessilibus, pedunculis unifloris apice squamosis, involucrio cylindræo scabro basi laxiusculo. \mathcal{L} ad fluvium Lenam Sibiriae. Hier. caule superius ramoso, foliis paucis lanceolatis Gmel. sib. 2. p. 30. t. 13. f. 1. bon. Folia coriacea avenia lanceolata obtusiuscula glanduloso-denticulata glauca subtus uti caulis floccosa. Involucris squamæ obtusæ dorso ad lentem setulis minimis scabræ, extimæ laxiusculæ glabræ. (v. s. sp. in herb. Schreb. ? comm. à cl. Pallas.)

44. *C. HETEROGYNA* (Frœl. mss.), caule erecto ramoso paucifolio paniculato, foliis glaucis subintegerrimis margine ciliatis scabris, radic. spathulato-lanceolatis petiolatis, caulinis sessilibus linearibus, pedunculis apice involucrioque farinosis, stigmatibus subtribus. \mathcal{L} ad rupes propè Ragusam Dalmatiæ, ad Jaderam. Hierac. stuppeum Reichenb. fl. exc. p. 265. Hierac. glaucum Asch. fl. jadr. p. 202? H. Tomasinii Host fl. austr. 2. p. 272? teste cl. Weiheo. Habitus Hier. glauci veri sed pappus egregie albus pluriserialis. Stigmata sæpissimè 3! singulare in genere exemplum. Color herbæ glaucus. Folia membranacea nervo præsertim margine pilis albis mollibus longissimis tuberculo conico nigro persistenti insidentibus, indè ad lentem quasi nigro-serrulata. (v. s. sp. comm. à cl. Welden.)

45. *C. PULMONARIÆFOLIA* (Frœl. in litt. 1837), caule erecto subaphyllo oligocephalo, foliis membranaceis reticulatis glaucescentibus ciliatis, radic. cordato-ovatis denticulatis, petiolis villosis, caulinis paucis bracteiformibus, capitulo cylindræo glabro gracili. \mathcal{L} in montibus Apenninis. Caulis vix spithamalis simplex sursum in pedunculos 3-4 divisus glaber. Folia exactè Pulmonariæ officinalis tenuia subdiaphana subtus reticulata. Capitulum gracile Prenanthidis. Pappus fructu columnari dimidiò longior. (v. s. sp. comm. à cl. Jan.)

46. *C. PYGMÆA* (Linn. spec. 1131), caule basi subramoso decumbente folioso, pedunculis elongatis submonocephalis apice involucriisque cano-floccosis, foliis petiolatis lyratis, lobo terminali maximo subcordato dentato, petiolaribus alternis minutis. \mathcal{L} in glareosis summorum Alpium Helvetiæ, Sabaudia! Gallia, Pyrenæorum. H. prunellæfolium Gonan obs. 57. t. 22. f. 3. opt. All. ped. t. 15. f. 2. bon. DC. fl. fr. 4. p. 54. Willd. herb. 14675! Omalocline Cass. Monn. ess. p. 76. Hieracium pygmæum Lam. H. pumilum Linn. Leonodon dentatum Linn. Lepicaune prunellæfolia Lepeyr. Achæmium apice attenuatum. Pappus albus pluriserialis.

β. *integrifolia* (Frœl. mss.), foliis integris ovato-lanceolatis dentatis longè petiolatis. Bocc. mus. 2. p. 33. t. 24. (v. s. sp. ex Alp. Helv.)

γ. *incanescens* (Frœl. mss.), herbâ totâ præsertim foliis albo-tomentosis in monte Ventoso. (v. s. sp.)

δ. *glandulosa* (Frœl. mss.), petiolis involucriisque glanduloso-hirsutis. (v. s. sp.)

ε. *colorata* (Frœl. mss.), venis foliorum rufis. (Helv. v. s. sp.)

47. *C. LAMPANOIDES* (Frœl. in litt. 1837), caule stricto folioso paniculato-corymboso foliisque hirtis, inferioribus lyratis dentatis basi auriculato-amplexicaulibus, superioribus integris cordatis amplexicaulibus, involucriis imbricatis acutis pedunculisque glanduloso-hispidis. \mathcal{L} in Pyrenæorum orient. sylvis