

trum breve sensim attenuata. Pappus pluriserialis pilosus albissimus. — Herba reg. Mediterraneæ incola perennis glabra. Radix tuberosa ovata. Caules basi flagelliformes sub terrâ fibroso-radicantes. Folia è collo orta ovali-oblonga utrinque acuminata integra aut subdentata. Scapi erecti apice summo cum involucri basi piloso-glandulosi aphylli simplices, rarissimè bifidi subfoliosi. Flores flavi.

1. *E. ZELOSIA* (Cass. l. c.). \mathcal{H} in arenis maritimis et etiam rariùs in rupium fissuris Galliarum australioris, Corsicæ, Italiæ, Siciliæ, Dalmatiæ, Istriæ, Archipelagi. Etiam ex Armoricâ misit cl. Bonnemaison. *Leontodon bulbosum* Linn. sp. 1132. *Hieracium bulbosum* Willd. sp. 3. p. 1562. *Crepis bulbosa* Fröhl. in lit. *Prenanthes bulbosa* DC. fl. fr. n. 2883. *Taraxacum bulbosum* Reichenb. fl. exc. n. 1792. *Hieracium stoloniferum* Viv. fragm. 1. t. 20. — *Clus. hist. 2. p. 145. f. 2. Lob. icon. t. 230. f. 2. (v. v. et s.)*

DCCCXXVII. *CREPIS* *Macrh. mech. 534. DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 38. Less. syn. 136. Fröhl. in lit. 1837 (1).* — *Crepis Phœcasium* et *Brachyderea* Cass. — *Crepidis* et *Hieraci* sp. *Linn. et succ.*

Capit. multiflorum. Invol. duplex, int. 1-seriale, ext. breve calyculiforme. Recept. epalesceum. Achania teretiuscula exalata sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus albus mollis multiserialis. — Herbarum pleræque Europæe annuæ aut biennes erectæ ramosæ. Folia sæpius pinnatifida, formâ in iisdem speciebus varia. Flores flavi. Invol. ferè Senecionis. — Genus naturalissimum cum ad hoc revocantur species omnes Hieraci auctorum pappo niveo donatæ. Cæterum specierum limites et diagnoses difficillimæ et genus monographis commendatum.

Sect. I. *PHÆCASIUM* *Reichenb. fl. exc. 1. p. 257. — Phœcasium Cass. dict. 39. p. 387.*

Capit. pauciflorum. Invol. squamæ exteriores adpressæ.

1. *C. PULCHRA* (Linn. sp. 1134), caule erecto basi simplici apice laxè paniculato, foliis radicalibus runcinatis basi attenuatis, caulinis ovato-lanceolatis basi sagittatis dentatis integrisve, invol. cylindraceo, squamis exter. paucis acutis brevibus margine scariosis. \mathcal{H} in rudertis et collibus Galliarum ferè totius, Germaniæ, Italiæ, Tauriæ, Asiæ occid., etc. *Chondrilla pulchra* Lam. dict. 2. p. 77. *Prenanthes paniculata* Moench met. 534. *Lampsana pulchra* Vill. dauph. 3. p. 163. *Prenanthes hieracifolia* Willd. sp. 3. p. 1541. *Prenanthes pulchra* DC. fl. fr. ed. 3. n. 2882. *Phœcasium lampsanoides* Cass. dict. 39. p. 387. *Hieracium pulchrum* J. Benth. hist. 2. p. 1025. *Prenanthes viscosa* Baumg. — *Moria, ox. 2. 7. t. 5. f. 13 et 37. Variat caule glabro aut pube parvâ scabro, foliis radical. runcinatis aut vix dentatis. (v. v. et s.)*

β. lampsanifolia, paniculâ confertiore, pedunculis brevioribus magis erectis.

\mathcal{H} *Hierac. leptomacrosaulos* Col. oeph. t. 269. *Crepis pulchra β* Linn.

1. c. *Crepis lampsanifolia* Reichenb. fl. exc. 1. p. 257. (v. s.)

Sect. II. *BRACHYDEREA*. — *Brachyderea* Cass. dict. 48. p. 429.

Capit. multiflorum. Invol. squamæ externæ adpressæ. Recept. subimbriciferum.

2. *C. RIGIDA* (Willst. et Kit. pl. var. hung. 1. p. 18. t. 19), subcaudex, caule erecto rigido striato, foliis dentatis rigidis, radicalibus obovatis, caulinis sagit-

(1) Sectiones generis IV, V et VI, à cl. Frölich elaboratæ sunt et usâ cum Hieraciorum synonymi communicatæ.

- β. runcinosa* (Froel.) mss. scapo 1-cephalo, foliis runcinato-pinnatifidis. (v. v. s. in Alp. Algov.)
- γ? taraxaciformis* (Froel. mss.), scapo monocephalo humili crassiusculo, capitulo tumido glabresculo, foliis spathulatis dentatis sessilibus. (v. v. in Taureno Rauriciensi in confinibus Salisburgie et Carinthie supra glacies aeternas). An propria species? Flos magnitudine et formâ Taraxaci Dentis-leonis, etc., sed croceus, scapus vix bipollicaris crassiusculus adscendens, folia obovato-oblonga vix petiolata, capitulum ovatum crassiusculum.
- δ. leiocephala* (Froel. mss.), scapo sub-2-cephalo, involucre glabro. (v. v. in Alp. Algov.)
- ε. Halleriana* (Froel. mss.), scapo diviso dicephalo. Taraxacum calycibus hirsutis squamis rectis Hall. hist. n. 57, t. 1. bon. (v. v. cum priore.)
- ζ. croceus* (Froel. mss.), foliis runcinatis utrinque glabris, caule paucifolio ramoso, ramis longis nudis unifloris calycibus villosis nigrescentibus. — Scapus 3-4-cephalus subfoliatus: pelusculis elongatis laxiusculis. Flos croceus. Involucri figura et indumentum idem ac in typo. Vix propria species et syn. Gmel. potius *H. alpestris* Jacq. adscribendum, cum auctor ipse flores flavos prædicat. (v. v. in Taureno Rauric.) (†)
37. *C. KRAISSLII* (Froel. mss.), scapo 1-cephalo aphylo foliisque glabris, primordialis integris linearibus, secundariis lanceolatis acutis subruncinato-dentatis, involucre glabresculo (flos flavus). ♀ in Alpibus Croatiae. Hieracium Alpinum Willd. herb. 14635! n. A! Nimis affinis *H. Alpino* à quo differt momento cl. Kitzebelo in litt., flore dimidiò minore constanter flavo, involucre ferè glabro basi tantùm pilis raris articulatis adperso, squamis multò angustioribus linearibus, foliis multò minoribus longè petiolatis. (v. s. sp. comm. à cl. Kit.)
38. *C. HETEROTRICHA* (DC. herb.), acaulis, foliis radicalibus linearibus oblongis acuminatis in petiolum attenuatis semipinnatifidis, lobis remotis acuminatis pilis rigidis glandulosis hirtellis, scapo foliis triplo longiore 1-cephalo scabro, pilis ad apicem et ad involucrem rigidis glanduliferis, invol. imbricato corollis longiore. ♀ in Oriente ad Alpes Zerokon dictas legit cl. Aucher-Eloy! Hieracium glandulosum Auch! pl. exa. n. 3549 non Schult. Achænia glabra Lævia, Pappus albus multiserialis. Ligulae flavæ invol. breviores. (DC. v. s. comm. à cl. Inv.)
39. *C. ARMENA* (DC. herb.), acaulis breviter glanduloso-pubescenti, foliis radicalibus obovatis oblongis in petiolum attenuatis acutè inciso-dentatis, scapo modo aut foliolis linearibus integerrimis gerente 1-cephalo, invol. squamis lanceolato-linearibus acuminatis circ. biseriatis. ♀ in Armenia legit cl. Aucher pl. exa. n. 3280! Herba 3-pollicaris Leontodontisfacie. (DC. v. s. comm. à cl. Inv.)
40. *C. ? SIMPLEX* (Froel. in litt. 1837), scapo 1-cephalo aphylo superne incrassato squamoso, involucre simplici cylindraceo, foliis spatulatis sinuato-dentatis. ♀? in pratibus propè Cyrenam Africae hoc. Hieracium simplex Viv. fl. libye. et in bot. zeit. 1825. p. 636. non Lapoyr. Plantam à me non visam hæc refero cum auctor fructus subrostratos indicat. An potius Barkhausie species? †
41. *C. SCHREBERI* (Froel. in litt. 1837), scapo submonocephalo subunifolio, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis linearibus subdentatis mucronatis, involucre simpliciusculo cano-tomentoso hirsuto. ♀? . . . Hierac. Gmelini Schreb. herb. Habitu affinis *H. alpestris* Jacq. à quo differt radicis capite albo-villoso, involucre imbricato nec squamis majoribus obvallato, foliorum laciniis dentibusque mucrone albo acuminato terminatis. (v. s. in herb. Schreb.)

(†) Sub nomine Hier. crocei recepi à cl. Turczaninow stirpem in lapideosis Transbaicalensis et arenosis Mongolicis crescentem, variantem caule simplici aut ramoso 1- aut polycephalo, pilis invol. albidis aut nigris. Mihi videtur species propria nempe Hier. croceum Lam. dict. 2. p. 360. Willd. sp. 3. p. 1571. Gmel. fl. sib. 2. p. 22. t. 8. f. 1. (DC. v. s.)