

pratique! et in Carinthiâ teste cl. Sternberg. H. lamsanoides Gouan obs. p. 57. t. 21. f. 3. bon. excl. syn. Gmel. Hier. lamsanoides Willd. sp. 3. p. 1580. *Soyeria lamsanoides* Monn. ess. p. 77. (v. s. s.)

ℓ. *copholepida* (Frœl. mss.), caule elato ramoso foliisque glabris, caulinis oblongis integris, involucri squamis obtusis. — *Hieracium lyratum* Schleich. exs. cult. (v. s. c. ex hort. goett. taur.)

48. C. *SMYRNÆA* (DC. in litt. ad Auch. 1837), caule erecto folioso sparse hispido, foliis hispidulis, infer. longè petiolatis lyratis lobo terminali ovato dentato, super. cordato-amplexicaulibus acuminatis acutè dentatis, ramis apice corymboso-paniculatis scabris, invol. glabriusculis. — circa Smyrnam legit cl. Ancher-Eloy pl. exs. n. 3360! Affinis C. lamsanoidi, sed folia inferiora basi non auriculata, superiora indivisa, invol. glabriuscula. (v. s. comm. à cl. inv.)

49. C. *PALUDOSA* (Mœnch meth. 535), caule erecto folioso corymboso foliisque glabris retrorsum dentatis, radic. oblongis basi attenuatis, caulinis hastato-amplexicaulibus, bracteis involucrique nigro-glanduloso-hispidis. ℥ in pratis et nemorosis rivulosis Europæ. *Hieracium paludosum* Linn. sp. 1129. Gouan obs. p. 76. excl. var. ℓ. Lam. ill. t. 652. f. 2. fl. dan. t. 928. DC. fl. fr. 4. p. 34. *Burkhausia paludosa* Baumg. Geracii sp. Mœsl. et Reichenb. fl. 2. p. 1368. *Achænia cylindrica striata lurida seu flavo-fuscescentia*. Pappus multiserialis.

ℓ. *exaltata* (Frœl. mss.), caule sesquicubitali corymboque glanduloso-hispidis H. paludosum All. ped. t. 28. f. 2. Pappus albus ad niveum vergens. (v. v. ad rivulos umbrosos Algoviæ.)

γ. *glabrescens* (Frœl. mss.), caule oligocephalo, involucri parte superiore bracteisque glabris. Bocc. mus. t. 54. (v. v. sp.)

δ. *subumbellata* (Frœl. mss.), capitulis umbellatis. (v. s. sp.)

ε. *pauciflora* (Frœl. mss.), caule pedali simplici submonocephalo. (v. v. sp. in alpestr. Algov.)

50. C. *LYRATA* (Frœl. in litt. 1837), caule erecto folioso corymboso-paniculato foliisque oblongis dentatis hirsutis, radic. caulisque inferioribus petiolatis runcinatis, superioribus cordato-amplexicaulibus, pedunculis involucrique glanduloso-hispidulis. ℥ ad margines sylvarum ad Jeniseam. *Hieracium lyratum* Linn. sp. 1129. — Gmel. sib. 2. p. 24. t. 9! haud bon. Caulis fistulosus cubitalis basi glabrescens, ramis erectis flexuosis polycephalis. Folia tenuia subdiaphana magna subtilis subglaucoscentia. Corymbus compositus ad lentem glanduloso-hispidus. Capitula formâ et magnitudine H. paludoso similia. (v. s. sp. comm. à cl. Gmel.)

51. C. *HIERACIOIDES* (Willd. sp. 3. p. 1601), caule erecto folioso corymboso foliisque molliter hirtis subintegerrimis, radic. elliptico-ovatorum petiolis glabris, caulinis lanceolatis basi cordato-amplexicaulibus, pedunculis involucrique nigro-hispidis. ℥ in subalpinis Austriæ! Hungariæ! Sabaudia! Helvetiæ! Baviaræ! et in pratis montanis Germaniæ mediæ, Elvacil fortè in Labrador si H. molle videtur idem ex Mey. labr. p. 59. *Hieracium molle* Jacq. fl. austr. t. 129. *Crepis hieracioides* Waldst. et Kit. pl. hung. r. p. 4. t. 70. Less. syn. 137. *Geracium succisæfolium* Reichenb. *Omalocline succisæfolia* Monn. *Wibelia hieracioides* fl. wett. Habitu C. paludosa L. proxima, à quâ differt pappo niveo et flore aurantiaco. Species ob indumenti et foliorum figuræ variabilitatem passim confusa. *Jacquiniana* planta herbæ hirsutis densâ brevi molli et glandulis involucri simplicibus excellit.

ℓ. *Croatica* (Frœl. mss.), caule foliisque minùs hirtis pedunculis glabriusculis, involucri glandulis simplicibus. — in pratis Hungariæ (v. s. sp. in herb. Willd. 14690!). H. Croaticum W. et Kit. pl. hung. t. 218. Hoffm. flor. 2. p. 414. (DC. v. s. c.)

γ. *succisæfolia* (Frœl. mss.), caule foliisque hirtis scabriusculis, pedunculis involucrique simpliciter glanduloso-hirtis. H. succisæfolium All. ped. n. 786. DC. fl. fr. 4. p. 28. Gmel. fl. bad. W. integrifolium Willd. sp. 3. p. 1568! Sturm flor. 39. opt. (v. v. sp.)