

- ? *Lonicera adenocarpa* Guss.
Galium litorale Guss.
Asperula Gussonii Boiss.
— *rupestris* Tin.
Scabiosa limonifolia Vahl.
* — *dichotoma* Ucr.
Cineraria ambigua Biv.
— *nebrodensis* Guss.
* *Senecio humilis* Desf.
* — *lycopifolius* Desf.
? — *glaber* Ucr.
Anthemis Gussonii.¹
— *drepanensis* Huet.
— *intermedia* Guss.
— *aetnensis* Schw.
— *Gemmellarii* Tin.
— *muricata* Guss.
Anacyclus pallescens Guss.
Evax tenuifolia Guss.
— *Heldreichii* Parl.
— *discolor* DC.
Helichrysum Errerae Tin.
Calendula maritima Guss.
Cirsium misilmerense Ces. et CC.
* *Carduncellus pinnatus* DC.
Carthamus turbinatus Nym.
Centaurea tauromenitana
Guss.
— *sicula* L.
— *busambarensis* Guss.
Hieractium lucidum Guss.
— *siculum* Guss.
Tragopogon nebrodense Guss.
Scorzonera deliciosa Guss.
- * *Microlonchus tenellus* Sp.
Andryala cossyrensis Guss.
Crepis Sprengelii.²
Leontodon sculus Nym.
Trachelium lanceolatum Guss.
— *halteratum* Bianca.
Fontanesia phyllireoides Lab.
Chlora sicula Tin.
Symphytum Gussonii F. Sz.
Lithospermum Splitgerberii
Guss.
Anchusa crispata Pr.
? *Alkanna Lehmannii* DC.
Myosotis incrassata Guss.
Cynoglossum siculum Guss.
? *Verbascum Gussonii* Tin.
Scrofularia Gussonii Nym.
Linaria humilis Guss.
Odontites rigidifolia Bth.
— *Citardae* Tod.
— *Bocconi* Walp.
— *Biancae* Guss.
— *sicula* Tod.
Orobanche Gussonii Nym.
— *Alexandri* Tin.
— *sanguinea* Pr.³
— *nebrodensis* Tin.
— *canescens* Pr.
— *bicolor* Bert.
— *lilorea* Guss.
Teucrium rosmarinifolium
Lk.
— *siculum* Guss.
Stachys dasyanthes Raf.
Calamintha Gussonii Tod.

¹ *A. clavata* Guss. non Willd. (*A. tubaeformis* Guss.?).

² È la specie che SPRENGEL ha ritenuto, erroneamente, identica alla *C. spathulata* Lk. riponendola nelle *Barkhausia*; però m'è parso dovere e chiarezza insieme il chiamarla così.

³ Nè questa, nè la seguente specie hanno avuto concessa autonomia nella *Flora italiana* del PARLATORE, continuata dal CARUEL. Essè sono state assorbite dall' *O. crinita* Viv.

- obtusus* Bess. 43. S. caule ramofo foliisque basi cordatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis divaricatis lineari-lanceolatis cuspidatis subintegerrimis, pedunculis tomentosis corymbosis, anthodiis glabris. *Podolia*.
- pectinatus* Cand. 44. S. caule ramofo, ramis pedunculis anthodiisque glanduloso-hispidis, foliis basi lata auriculatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis linearibus cuspidatis integerrimis, pedunculis subpaniculatis divaricatis. *Gallia provinc.*
- perzoneraefornis* Lag. 45. S. foliis decursive pinnatis, foliolis linearibus, pedunculis squamosis 1floris, squamis anthodii margine scariosis. *Hispan. austr.*
- patulus* * 46. S. foliis decursive pinnatis glabris, laciniis rhombeis denticulatis deorsum versis, petiolis basi auriculatis, pedunculis subcorymbosis anthodiisque glanduloso-hispidiusculis. *Ad Pauphlipum Neapol. et in Sicilia.*
- angustifolius* Desf. 47. S. subcaulis, foliis pinnatis glaberrimis glaucis subcarnosis, foliolis linearibus dentatis, pedunculis squamatis, anthodio glabro. *Numidia.*
- integerrimus* 48. S. caule ramofo foliisque bipinnatifidis glabris, laciniis angulatis obtusis petiolisque basi dilatatis auriculatis, anthodiis tomentosis demum turgidis. *Gallia austr.* (Cultu tomentum anthodii et dentes foliorum fere amittit.)

2881. BORKHAUSIA Böhm. (Barckhausia Mönch.)

* *Foliis indivisis.*

- muricata* * 1. B. caule ramofo superne setoso, foliis pilosis, radicalibus obovatis petiolatis dentatis, caulinis sagittatis subintegerrimis, floribus corymbosis, anthodiis muricatis hispidis. *Helvetia. Lachenal. Cyprus. Sibth. Afric. bor. Cella.* (Crepis muricata Sm., Crepis n. 32. Hall. Stirp., Cr. nudiflora Viv.)
- versicolor* * 2. B. caule erecto foliisque lanceolatis elongatis acutis repandis glabris, radicalibus longe petiolatis, caulinis sessilibus, involucri foliolis albo-marginatis. *Dauria.* (Lagomeris versicolor Fisch.)
- bellidifolia* Cand. 3. B. glaberrima, caule ascendente paucifloro, foliis radicalibus spathulato-oblongis subintegerrimis, caulinis sagittato-oblongis, involucre anthodii subfarinoso. *Corfica.* (Crepis bellidifolia Loif.)
- † *Suffreniana* Cand. 4. B. caule erecto basi piloso, foliis radicalibus oblongis sinuatis, caulinis paucis sessilibus linearibus, involucre farinoso. *Gallia provinc.* (Crepis bellidifolia var. Loif.)
- spathulata* * 5. B. caule erecto glabro superne nudiusculo, foliis radicalibus spathulato-oblongis deorsum dentatis, caulinis lineari-lanceolatis acutis, ramis

- 1floris, anthodio hirsutiusculo. *Sicil.* (Crepis spathulata Guffon.)
- macrophylla* * 6. B. caule erecto ramofo piloso, foliis inferioribus ovato-oblongis dentatis hirsutis, superioribus lanceolatis amplexicaulibus, floribus corymbosis, anthodio hispidulo. *Numidia.* (Crepis macrophylla Desf.)
- Candollei* * 7. B. caule ramofo diffuso pubescente, foliis omnibus oblongis sinuato-dentatis semiamplexicaulibus glabrisculis, pedunculis longissimis 1floris, involucre caduco, anthodio hispidulo. *Patria?*
- senecioides* * 8. B. caule humili simpliciusculo subaphyllo, foliis radicalibus spathulatis profunde serratis, pedunculis corymbiferis, anthodio hispidulo. *Aegypt.* (Crepis senecioides Delil., *Hyoseris hirta* Balb. W.)
- alpina* Link. 9. B. caule erecto stricto dichotomo aspero, foliis amplexicaulibus cordato-sagittatis oblongis dentatis, pedunculis elongatis 1floris, involucre lato scariofo, anthodio hispidulo. *Alp. Europ. med. Sibir.* (Crepis alpina L.)
- apargioides* * 10. B. caule erecto superne hispidulo subaphyllo, foliis spathulato-lanceolatis elongatis deorsum dentatis glabris, pedunculis elongatis corymbiferis, involucre obsoleto, anthodio nigrescente hispidulo. *Alp. noric. rhact.* (Hieracium stipitatum Jacq., Crepis apargioides W., *Wibelia Rölling.*)
- vesicaria* * 11. B. caule erecto paucifolio scabro, foliis radicalibus obovato-oblongis deorsum dentatis subsinuatis hirsutiusculis, summis lanceolatis integerrimis, floribus corymbosis, bracteis concavis involucreoque amplo scariofis. *Creta.* (Crepis vesicaria L.)
- repens* * 12. B. caule repente foliisque lanceolatis repando-denticulatis glabris, pedunculis elongatis. *China austr.* (*Picris repens* Lour.)
- ** *Foliis runcinato-lyratis f. pinnatifidis.*
- hyemalis* * 13. B. caule suberecto foliisque hirsutiusculis, radicalibus lyrato-runcinatis, laciniis denticulatis, caulinis amplexicaulibus hastatis basi pinnatifidis, anthodii squamis carina pilosis. *Sicilia.* (Barkhausia Bivon. B. reflexa Presl.?)
- purpurea* * 14. B. radice perenni, caule ramofo superne nudiusculo glanduloso-piloso, foliis radicalibus interrupte lyrato-runcinatis hirsutis, laciniis inaequalibus denticulatis, pedunculis 2fidis anthodioque glanduloso-pilosis, involucre amplo scariofo. *Sicilia.* (Barkhausia Bivon.)
- rubra* Link. 15. B. radice annua, caule erecto subramoso glabro, foliis radicalibus runcinato-lyratis, caulinis lanceolatis subpinnatifidis, pedunculis 1floris elongatis, anthodio hispidulo, involucre scariofo. *Napol.* (Crepis rubra L.)