

T. Georgieff.

## Zwei Crepis-Arten aus Bulgarien.

*Crepis virens* Vill. Delph. 3 p. 142 (1779). D. C. Prodr. 7 p. 163. In den Gärten in Sofia 1915. (Leg. N. Stojanoff). Das Vorkommen dieser Art in Sofia wurde schon einmal von B. Achtaroff referirt, bis jetzt aber nicht veröffentlicht.

*Crepis Stojanovi* n. sp. (Section *Phaecasium* Cass). Annuua. Radix fusiformis. Folia omnia basalia, grosse vel pinnatifido-serrata et in petiolum sensim angustata, utrinque pilis brevibus, mollibus, albis, sparse hirta. Caule ad 30 cm. alto, parte inferiore pilis crispis albis obsite, superne glabro, dichotome ramoso, vel corymboso 3—5 cephalo. Involocrum ad 8 mm. longum; sub anthesim cylindricum, post anthesim urceolato inflatum. Involucri phylla bisserialia. Phylla externa brevissima ovata interna oblongo-linearica apice  $\pm$  obtusiuscula, glabra, ad marginibus inferne late superne anguste membranacea Fructi ad 3 mm. longi artuato-incurvati, non rostrati. Pappo pilis mollibus tenuissimis albis. Ad Harmanli; leg. N. Stojanoff.

Unter den in Europa vorkommenden *Crepis* Arten gehört nur die in Süd- und Mitte! Europa wachsende *Crepis pulchra* L. zur Sect. *Phaecasium*. Diese Art unterscheidet sich aber von der oben beschriebenen wie folgt:

<i>Cr. pulchra</i> L.	<i>Cr. Stojanovi</i> Georg.
Stengel beblättert	Stengel blattlos; alle Blätter grunständig, Rosetten bildend
Blätter beiderseits behaart	Blätter fast kahl, nur am Stiele etwas haarig
Körbchen verkehrtkonisch-cylindrisch	Körbchen zur Fruchtzeit bauchig geschwollen
Früchte gerade, schwach gestreift	Früchte bogeförmig, mit 10 deutlichen Rippen



*Crepis Stojanovi* Georg. n. sp