

lina late lanceolata utrinque acuminata, dentata aut sinuato-subpinnatifida. Capitula minuscula sparsa. Phyllaria 6-8 anguste oblonga haud acuta. Achænia teretia striata glabra apice angustata haud rostrata. Pappus sordidus aut luridus subcyaneus.

*Hab.* In Sikkim ad 8,000-13,000 ped. alt. leg. J. D. Hook.

(9.) *Crepis glomerata* Decne in Walp. Rep. II. p. 691 *Crepis depressa* Hook. f. et Th. in Herb.

Rhizoma crassum. Acaulis. Folia rotunda, basi saepe cordata, longe petiolata, integra aut denticulata, carnosula pubescens-t-scabra petiolis basi dilatatis membranaceis ciliatis. Capitula c. 10. sessilia fastigiata, mediocria. Phyllaria 6-8 elliptico-oblonga obtusa glabra marginibus membranacea. Achænia anguste cylindrica teretia striata, glabra aut minute scabrida, sursum attenuata haud rostrata. Pappus tenuis albidus.

*Hab.* In Sikkim ad 15,000-17,000 ped. alt. leg. J. D. Hooker et sub nomine *Crepide depressa* misit.

(10.) *Crepis Hookeriana* nov. sp.

Acaulis, aut caulis fere pedalis villoso-lanatus. Folia anguste oblonga 2-6-pollicaria petiolata pinnatifida aut sinuato-dentata, villosa, subtus pallidiora. Capitula hemisphærice congesta : fulva lana dense obsita aut parum villosa. Phyllaria elliptica valde obtusa marginibus scariosa glabra aut dorso scabride hirta. Achænia cylindrica, sursum vix attenuata, obscure striata. Pappus in sicco rufus aut cærulescens, intense coloratus luridus.

*Hab.* In Sikkim ad 13,000-17,000 ped. alt. leg. J. D. Hook. et T. Anderson. A horto Kewensi sub nomine *Crepide glomerata* Decne a cl. Hook. f. dimissa.

(11.) *Crepis Stoliczkae* in Herb. Kurz.

Scaposa undique villosula. Folia petiolata spathulato-oblonga sinuato dentata. Scapus 4-8-pollicaris apice corymbo dense adgregato terminatus. Capitula minuscula. Phyllaria (villosa) 8-10 anguste oblonga acuta, bracteolis paucis linearibus basi adjectis. Achænia anguste cylindrica striata teretia glabra apice elongata parum attenuata. Pappus tenuis albidus.

*Hab.* In Lahul, in Kashmir boreali, ad 9,500-13,500 ped. alt. mense Junio florentem leg. Dr. Stoliczka.

Quasi *Crepidis præmorsæ* Fræl. forma alpina : cf. *Crepidem multi caulem* Ledeb. speciem mihi ignotam.