

Lactuca scarioloides Boiss. — Boiss. III. 810. — Bornm., Pl. Str. XX. 175.

In m. Raswend, Baba Khudadad (4. VII. 1909).

Chephalorrhynchus hispidus (M. B.) Boiss. β . *caeruleans* (Hausskn. herb. pr. sp.) Bornm., Coll. Str. nov. XXVIII. 266. — Synon.: *Cicerbita hispida* Beauv. (var.).

Kerind, in m. Noa-Kuh (VI. 1910), Kuh-i-Marab (V. 1910), Kuh-i-Gawarreh (20. V. 1909). — Nehawend, in m. Kuh-i-Gerru (VII. 1908).

Crepis Straussii Bornm., Coll. Str. nov. XXVIII (1911), 266—267 (nomen seminudum). — Sectio: *Eucrepis*. § 2. *Fusiformes*. *Pleiocephalae* (Boiss., fl. Or. III. 831).

Radice perenni verticali multiceps; caulis numerosis, subpedalibus, crassiusculis, infra medium dichotome patule ramosis, 3—5-cephalis, ad dichotomiam inferiorem late amplexicauli-foliatis, superne subnudis; foliis glaberrimis, rarius subtus tantum parce puberulis vel margine pilosulis, in fimbriis majusculis (10—18 cm longis et 2—3 cm latis), runcinato-pinnatifidis, lobis lateralibus triangularibus, lobo terminali oblongo obtuso subintegro; foliis caulinis dichotomia ruma inferiorum late oblongis vel oblongis, late auriculato-amplexicaulibus, margine late triangulari lobatis vel subintegris, summis valde reductis; pedunculis (ramis floriferis) crassiusculis, arcuatis, glabris, nudis vel foliis valde diminutis linearibus (bracteiformibus) hinc inde obsitis; capitulis majusculis, multifloris; involucris (ca. 12—15 mm longi) pallidi farinoso-canescens phyllis externis quam interna adpressa 2—2 $\frac{1}{2}$ -plo brevioribus linearibus subpatulis, mediis et internis latiusculis (2 mm latis) pallide virentibus, margine (interdum undulato-) membranaceis apice fuscescentibus, nervo mediano viridi demum ad basin incrassato pallido (saepe setis brevibus latis crassis flexuosis brunneis plus minus dense vel parce tantum obsito) percursis; flosculis flavis, involucrum eximie superantibus, ca. 2 cm longis; achaeinis inaequilongis, mediis longiuscule attenuatis sed non rostratis, glabris (nondum maturis), papo niveo.

Kermanschah, in m. Kuh-i-Parrau, in faucibus Nudschuheran (15. VI. 1906) et Teng-i-Dinawer (4. V. 1904). — In m. Schahu (V. 1909).

Die neue Art ist neben *C. auriculifolia* Sieb. (orig.!) und *C. sonchifolia* M. B. zu stellen. Die letztgenannte, im Kaukasus heimische Art ist schon habituell („caule a parte inferiore dichotome ramosissimo“) sehr verschieden.

Crepis Elymaitica Bornm. (spec. nov.). — Sectio: *Eucrepis*. § 2. *Fusiformes*. *Pleiocephalae* (Boiss., fl. Or. III. 831). — Tabala nostra XIX. 1 a.

Planta perennis parce glanduloso-pubescent, rupicola, radice crassa verticali, collo caespitose pluricipite squamoso multicaulis;