

Totum glabrum, foliis ambitu oblongo-obovatis in petiolum attenuatis apice rotundatis parce pinnatifido-runcinatis, capitulo mediocri, involucri phyllis internis non multis apice corniculatis externis late lanceolatis duplo longioribus, omnibus adpressis, achenio infra rostrum laeve aequilongum acute muricato, rostro dimidium involucrum non superante, flosculis saturate aureis. — Species haud bona, sed insignis. Affinis est *T. laevigato* DC. (*T. alpestre* DC., *T. Hoppeanum* Grsb., *T. nigricans* Vit.), sed phylla habet semper adpressa, capitula minora.

*Ar. geog.*: Trss., Serb., Roman., Cauc. etc.

**T. leptcephalum** Rchb. ? In arenosis humidis salsis ad Pontum prope Varnam (Vel). *Варна*

Foliis ambitu oblongis saepius in lacinas angustas pinnatifiditas, scapis gracilibus tenuibus, capitulo subminore anguste cylindrico, involucri rubelli phyllis internis numerosis lineari-lanceolatis late hyalino-marginatis, externis linearibus patulis numerosis, achenio ad apicem muricato in rostrum duplo longius sensim attenuato. Folia glabra, scapus lanatus vel subnudus. — Persuasum habeo, hanc speciem bonam nec varietatem *T. officinalis* esse, nam characteres ejus graves etiam in cultura immutati servantur.

*Ar. geog.*: Reg. Danub.

**T. serotinum** Poir. (WK). ? (*T. lanuginosum* Noë, *T. syriacum* Boiss.). In graminosis et ad vias prope Razgrad, Varna (Vel), Lom Palanka (Vel. Pč), Radomir, Kistendyl (Vel. Vs), Karnabad, Sliven (Šk), Stanimaka, Philippop. (Vel).

Variat foliis plus minus runcinatis vel tantum dentatis.

*Ar. geog.*: Morav., reg. Danub., Ross. mer., Maced., Thrac., Oriens., Sibir. Ur.

### Crepis L.

I. Achenia evidenter rostrata.

a) Capitula ante anthesin nutantia.

**C. foetida** L. (K.) ⊙ In collibus aridis supra Dragoman Bogaz (Pč), ad Sliven (Šk), Sofia (Šk), Philippop. (Stř), Belova (Stř).

Involucrum cano-tomentosum pilis simplicibus gracilibus et glanduliferis parce obsitum.

*Ar. geog.*: Eur. med. austr., Oriens.

- C. rhoedifolia** MB. ☉ In ruderatis, incultis, ad vias regionis calidioris. Prope Varna (Brn. Jav.), Aitos, Sliven, Sotira, Golem Bojalak, Četalovo, Derekjöv, Ichtiman (Šk), Stanimaka (Vel), Kalofer (Stř).

Involucrum paulisper canum pilis rigidis creberrimis maxima ex parte glandulosis setoso-hispidum.

*Ar. geog.*: Boh., Mor., reg. Danub., penins. Balk., Oriens.

- C. Stříbrný** sp. n. ☉ Annua, tota aspero-hirta, caule erecto foliato supra basin ramoso *polycephalo*, foliis hirsutis, inferioribus in petiolum attenuatis runcinato-pinnatifidis, caulinis basi incisa biauriculatis oblongolanceolatis repando-dentatis dentibus acutis apice crustaceis, pedunculis elongatis ante anthesin cernuis tandem *angulo recto arcuato-patentibus aphyllis vel 1—2 bracteis minutis instructis apicem versus sensim et valde incrassatis sub capitulo constrictis*, capitulis mediocribus, *terminalibus pedunculis brevioribus suffultis*, involucre parce tomentoso crebre setoso pilis flexuosis longis eglandulosis, phyllis externis tandem patentibus anguste linearibus acuminatis internis lineari-lanceolatis acutis tandem dorso indurato-carinatis dimidio brevioribus, involucre sub fructu apice *valde constricto*, acheniis externis haud striatis apice subattenuatis erostris involucre multo brevioribus, internis striatis apice minute scabridulis in rostrum tenue *eis brevius vel subaequilongum attenuatis involucre paulo brevioribus vel id subaequantibus*. Floret aestate.

Caulis 25—40 cm altus, involucrum sub fructu 10 mm × 5—6 mm.

In graminosis planitiei Sadovo-Philippop. a. 1890 legit amic. *Stříbrný*.

Species ad *C. foetidam* et *C. rhoeadifoliam* arcte accedens sed certe ab iis diversa. Caulis ramositate polycephalus, pedunculi valde insignes: laterales e basi tenui angulo recto excedunt tandemque arcuatim curvantur apiceque valde sunt incrassati. Pedunculi terminales semper sunt breviter pedunculati et pedunculis inferioribus 1—2nis proximis longe superati. Capitula sunt evidenter minora ac in speciebus memoratis. Foliorum forma indumentoque convenit cum *C. rhoeadifolia*. *C. rhoedifolia* et *C. foetida* habent pedunculos apice non incrassatos vel vix manifeste incrassatos semper valde elongatos erectos foliosos (saltem

plurimos laterales), terminales et laterales subaequilongos, achenia interna involucri multo longiora vel id subaequantia magis asperula in rostrum eis multo longius vel sublongius attenuata. Ceterum est tota planta minus ramosa capitulis multo majoribus sed plus duplo paucioribus.

b) Capitula semper erecta.

**C. setosa** Hall. ☉ (*C. hispida* WK.). In campestribus, ruderalibus et ad vias a planitie ad regionem submontanam ubique vulgaris.

Variat capitulis minimis et majoribus, floribus saturate et pallide luteis, pedunculis glabris et hispidis.

*Ar. geog.*: Eur. med., Ital., penins. Balk., Pontus Laz., Cauc., Trascauc.

II. Achenia apice plus minus attenuata sed nunquam rostrata.

a) Perennes. — α) Rhizoma praemorsum, caulis efoliosus simplex apice capitulis pluribus minoribus terminatus.

**C. praemorsa** Tsh. (L). ♀. In declivibus m. Vitoša (Vel. Vs. Šk), ad Razgrad, Varna (Vel), Sliven (Šk).

*Ar. geog.*: Eur. med., reg. Danub., Cauc., Sibir.

β) Rhizoma fusiforme, caulis foliosus in ramos paucos macrocephalos divisus vel pluricephalus.

• **C. viscidula** Froel. 1838. ♀. (*Hieracium pyrenaicum* Roch., *Hierac. ochroleucum* Panč., *Crepis nigra* Velen. 1886). In herbis alpinis m. Štrbi Kamen (Pč), m. Vitoša, m. Rilo (Vel), m. Osogovska Planina (Vel. Vs), m. Petrohan-Balkan (Vel. Vs), m. Etropol-Balkan (Vel).

Facie *Hieracium* aemulans, capitulis paucis nigris pedunculis elongatis evidenter incrassatis nigro-glanduloso-pilosis suffultis, foliis superioribus amplexicauli-ovatis acute dentatis, inferioribus inferne runcinatis membranaceis insignis.

*Ar. geog.*: Banat., Trss., Mtn., Bosn., Serb.

• **C. grandiflora** Tsch. ♀. In herbis alpinis m. Rilo (Pč), m. Vitoša, m. Kom et m. Petrohan-Balkan (Vel. Vs).

*Ar. geog.*: Alpes Eur. med., reg. Danub.

• **C. balcanica** Vel. 1890. ♀. Perennis, radice fusiformi verticali, caule foliisque aspero-hirtis omnino eglandulosis, foliis radica-