

P. Saharae Pomel. — Diffère du *P. discolor* par ses feuilles plus étroitement laciniées, ses achaines plus petits et ses écailles du péricline très largement membraneuses, les internes oblongues et non linéaires. ④ Metlili. (v. s.)

P. maroccanum Ball. Maroc.

ZACINTHA Tournefort.

Péricline imbriqué, urcéolé, anguleux; écailles internes gibbeuses au sommet, enveloppant les achaines extérieurs gibbeux et à aigrette latérale; achaines internes cylindriques.

Z. verrucosa Gærtner; Desf., fl. atl. — Plante basse, dichotome à petits capitules sessiles et terminaux. « Habitat in arvis » Desf.

CREPIS L.

Péricline imbriqué à écailles externes formant habituellement calicule; achaines à 10-30 stries longitudinales, amincis au sommet, souvent rostrés; aigrette à soies capillaires, rarement nulle sur les achaines extérieurs; réceptacle nu ou fibrilleux.

§ 1. *Ceramiocephalum* Schultz-Bip., Bull. soc. bot. Fr., vol. IX, p. 284. — Achaines peu ou pas atténués au sommet; aigrette très courte et très caduque à soies inégales; réceptacle resserré, conservant les achaines à maturité.

C. patula Poiret, Voy. II, p. 227; *Ceramiocephalum patulum* Schultz-Bip.; *Lampsana virgata* Desf., fl. atl., tab. 215; Munb., cat. — Souche vivace, couronnée par les anciens pétioles; feuilles radicales pétiolées, oblongues (1-2 décim.), entières, dentées ou roncînées, glabrescentes, les caulinaires peu nombreuses, sessiles; tiges dressées, glabrescentes (3-5 décim. ou plus), un peu pubescentes à la base et divisées en 2-4 longs rameaux monocéphales; péricline resserré vers le milieu, à la fin fortement induré, contracté, un peu pubescent, à écailles linéaires, les internes lancéolées; achaines tous semblables, bruns, à 20 stries dont 5 plus saillantes; capitule épanoui large de 4 cent. environ. ♀ Mai-juin. La Calle (Poiret), Fort-National (Durando), Tigremount, El-Kseur, etc.

§ 2. *Phæcasium* Reich. — Capitules pauciflores; achaines atténués en bec court, quelques-uns à la périphérie parfois privés d'aigrette; péricline glabre à écailles externes minuscules, les internes lancéolées-aiguës, à la fin réfléchies, indurées et carenées; réceptacle alvéolé.

C. pulchra L.; Lx, cat. Kab.; Ball, spic.; Reich. 80. — Plante glabre dans le haut, grêle, dressée, ramifiée en corymbe

fastigié; feuilles inférieures pétiolées, pubescentes-glanduleuses, les caulinaires décroissantes; capitules cylindriques sur de longs pédoncules; fleurs médiocres; achaines linéaires à 10 stries. ④ Avril-juin. Djurdjura (Lx), Aflou (Clary). Maroc, Europe moyenne et mérid.

§ 3. *Barkhausia* Moench. — Achaines, au moins les internes, rostrés.

a. Pédoncules penchés avant la floraison.

C. fetida L.; *Barkhausia fetida* DC.; Munb., cat. — Plante hispide (2-4 décim.), généralement très rameuse dès la base; feuilles roncées, à lobes aigus, sinués-dentés, les caulinaires sessiles, embrassantes; capitules solitaires sur de longs pédoncules renflés et bractéolés au sommet; péricline pubescent à écailles externes linéaires, appliquées, les internes lancéolées, à la fin indurées (10-12 millim.); achaines du bord sans bec, à aigrette ne dépassant pas le péricline; achaines centraux longuement rostrés, à aigrette exserte. ④ Constantine (Sidi Mecid). Europe, Orient.

C. senecioides Delile, fl. Eg., tab. 42-2. — Plante rameuse dès la base, à tiges ascendantes; feuilles presque toutes radicales, glabrescentes, oblongues, denticulées ou subroncées, à dents spinuleuses; tiges ramifiées en corymbe, à 2-5 capitules longuement pédonculés; péricline de 8 millim., cylindrique, pubescent-glanduleux; écailles internes à la fin indurées, logeant les achaines extérieurs insensiblement atténués en bec; achaines médians subcomprimés, à 10 stries, à bec hyalin, muriculé, aussi long qu'eux ou plus long. ④ Avril-juin. Bibans, Biskra, Tunisie, Égypte.

NOTA. — Notre plante, identique à la plante de Gabès et à la figure de Delile, a le bec des achaines moins long que ne l'indique Boissier, fl. d'Or. C'est la plante décrite par M. Pomel sous le nom de *B. Kralickii*.

C. suberostris Coss. et DR (sub *Barkhausia*); Munb., cat. — Plante glabrescente, rameuse dès la base, à rameaux dressés; feuilles inférieures pétiolées, lancéolées, entières, dentées, sinuées-pinnatifides, ou pinnatipartites, à lobes aigus; feuilles caulinaires embrassantes, auriculées, les supérieures subulées; capitules médiocres, en corymbe irrégulier; péricline hispide à écailles externes sétacées, les internes lancéolées-aiguës, égalant l'aigrette, peu indurées à maturité; ligules petites, dorées; achaines fusiformes, un peu comprimés, très courts (2, 2 1/2 millim.), à 10 stries, à bec à peu près nul; aigrette blanche, très caduque, égalant 2 fois l'achaine. ① ② Sables à Mostaganem.