

Sonchenkraut, *Sonchus laevis angustifolius* II. Tabern. p. 498 mit Abbild.

138) *Sonchus palustris* Lin.! herb. — F. Sz.

VII. *Sonchus arborescens*, Baumsonchenkraut Tabern. p. 500 mit Abbild.

139) *Wibelia foetida* Sz Bip. Cichoriaceoth. n. 64. — F. Sz.

*Crepis foetida* Lin.! herb. fol. 1—4. — Poll.

*Senecio major* Trag. cap. 96. III. Wollechtig Kreuzwurtz, *Senecio tomentosa* III. Tabern. p. 463 mit Abbild.

Der eigenthümliche Geruch dieser Pflanze veranlasste mich, sie bei hysterischen Affectionen als Infusum anzuwenden und zwar zur grössten Befriedigung.

140) *Crepis taraxacifolia* Thuil. — F. Sz. — Sz. Bip. Cichoriaceoth. n. 62.

Diese am obern Haardtgebirge so häufige Pflanze glaube ich zu erkennen in:

XI. Habichkraut, *Hieracium condrylloides* Tabern. p. 494 mit Abbild.

141) *Crepis setosa* Hall. fil. — F. Sz.— Sz. Bip. Cichoriaceoth. n. 61.

Diese bei uns mit fremden Saamen, namentlich von *Medicago sativa* eingewanderte, auch dieses Jahr am Wege zur Eisenbahn bei Deidesheim beobachtete Pflanze, kommt auf der Rheinfläche, namentlich bei Ludwigshafen in Aekern und an Wegen in grosser Menge vor.

142) *Crepis tectorum* Lin! herb. — F. Sz. — Sz. Bip. Cichoriaceoth. n. 123.

*Crepis Dioscoridis* Poll. non Lin.— II. Habichkraut, *Hieracium* II. Tabern. p. 491 mit Abbild.

Diese ausgezeichnete Art bildet eine Untergattung von *Crepis*, welche ich *Melanachaenium* nenne: *achaenia* ma-

turitate nigra, 10 — costata, costis crassiusculis, pappus niveus, persistens, radix ramosissima, fibrosissima.

143) *Crepis virens* Lin. — F. Sz. — Sz. Bip. Cichoriaceoth. n. 122.

*Crepis Dioscoridis* Lin! herb. fol. 2.

*Crepis tectorum* Poll.

I. u. IV. Habichkraut, *Hieracium* I. u. IV. Tabern. p. 491 mit 2 Abbild.

144) *Inthybus praemorsus* Fries! — F. Sz. — Sz. Bip. Cichoriaceoth. n. 50.

*Hieracium praemorsum* Lin! herb. — Poll.

Unsre Alten haben diese Pflanze nicht, wohl aber als *Hieracium latifolium praemorsa radice, caule singulari, Pilosellae majori affine* J. Bauh. hist. II. p. 1633 mit Abbild.

145) *Brachyderea biennis* Sz Bip. Cichoriaceoth. n. 59. — F. Sz.

*Crepis biennis* Lin.! herb. — Poll. — Unsere Väter haben diese bei uns so gemeine Wiesenpflanze übersehen. Es ist:

*Hieracium luteum hirsutum* und *Hieracium erucaefolium hirsutum* J. Bauh. II. p. 1024 u. 1025 mit Abbildungen.

146) *Brachyderea nicæensis* Sz Bip. Cichoriaceoth. n. 121. — F. Sz.

*Crepis nicæensis* Balb.! misc. alt. p. 28 (an. 1806). — Sz Bip. in Skofitz öster. bot. Wochenbl. 1852 p. 10—12. — Rchb. f. ic. Cichoriac. tab. 89, opt.

Diese bei uns eingewanderte Mittelmeerpflanze wurde früher mit der vorhergehenden Art verwechselt.

147) *Phaecasium pulchrum* Rchb. f. Ic. Cichor. p. 39 t. 80. — F. Sz.

*Crepis pulchra* Lin.! herb.

*Hieracium pulchrum* J. Bauh. p. 1025 mit Abbild.

Ebenfalls eine eingewanderte, sich leicht vermehrende, Mittelmeerpflanze.