

radicali picciolate, roncinato-lirate, a lacinie triangolari-oblunghe, intere o poco dentate, la terminale più grande, triangolare, le caulinne sessili, 1 o 2 infer. simili alle radicali, le altre lanceolate o lineari, dentate o laciniate alla base, le supreme bratteiformi. Fi. $\frac{1}{2}$ -1 volta più lunghi dell'involucro. Acheni lunghi 4-5 mm., a rostro lungo circa 2 mm. Il resto c. s. ⊖. *Muri, boschi e rupi dal mare alla reg. alp. nel Piem. e rimanente della Pen. dalla Lig. ed Emil. in giù, Sic., Eolie, Capri, Ischia, Sard., Cors., Maddalena ed Arcip. tosc. Apr.-Aut.* [Franc. mer.]. — Barkhausia Spr. — B. Lentodon DC. — B. taraxacifolia Ten., non DC. — Lagoseris Lk. — L. taraxacoides Rchb. — Apargia magellensis Ten. in hb. flor.

10 C. leontodontoides All. 3902

A Involucro glabro. — Pianta nel resto affatto glabra o quasi ovvero (*b. triangula* [Presl.]) viloso-irsuta alla base dei fusti e nei picciuoli. Capolini talora (*c. tenerima* Nob. = Barkhausia Ten.) grandi solo metà dell'ordinario. — Esclusiva o prevalente al nord, più rara al sud. α TYPICA

B Involucro ispido-glanduloso assieme coi peduncoli. — Pianta nel resto glabra ovvero (*b. villosa* Nob.) viloso-irsuta pure alla base dei fusti e nei picciuoli. Capolini talora (*c. microcalycina* Guss.) grandi metà circa dell'ordinario. — Esclusiva o prevalente al sud della Pen. e Sic. — Barkh. nuda Presl — *C. ætnensis* Presl.

β PRESLII NICOTRA

17 (14) *Acheni grigiastri a maturità, con rostro filiforme uguale al corpo. Capolini eretti prima dell'antesi.* Pianta aspra per setole patenti, ora scarse o talora (*b. glabra* Sang.) mancanti nelle fg., ora (*c. hispida* [W. et K.] = Barkh. Lk.) abbondanti specialm. sui rami. Fusti eretti, fogliosi, per lo più assai ramosi (2-6 dm.). Fg. infer. obovate, picciolate, roncinato-dentate o pennatifide, raram. (*d. subintegrifolia* DC., sub Barkh.) semplicem. dentate in for. a fusto quasi semplice; le super. sessili, lanceolate, saettate e per lo più inciso-dentate alla base, le supreme bratteiformi. Capolini formanti delle cime lasse, corimbose; involucro campanulato, a squamette esterne patenti. Fi. c. s. Acheni striato-tubercolati. ⊖. *Prati e luoghi erbosi dal mare alla reg. mont. nell'Istria, Pen. ove diviene più rara al sud, Sard., Cors., Capraia, Caprera, Pianosa e Gorgona. Giu. Lugl.* [Eur. centr. Pen. balc. Ponto Taur. Cauc. Alger., nat. Danim. Belg. Ingh. ecc.] — Barkhausia DC. — *C. Suffreniana* Gib. et Pir.

11 C. setosa Hall. 3903

— *Acheni rosso-scuri a maturità, con rostro più breve del corpo. Capolini sempre chinati prima dell'antesi.* 18

18 *Acheni lunghi 5 mm. circa, con rostro lungo $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ del corpo. Fusti aculeolato-ispidi in basso, ramoso-corimbosi in alto (5-30 cm.). Pianta di un verde-scuro. Fg. pubescenti. Involucro lungo 5-7 mm., minutam. pubescente ed inoltre cosparso di setole nerastre glandulifere. Nel resto simile alla *C. negletta*, colla quale potrebbe scambiarsi. ⊖.* [Franc. mer.]. — Barkhausia DC.

12 C. Suffreniana Lloyd 3904

A Fusti in alto e peduncoli glabri o cosparsi di pochissime setole nerastre glandulifere. Involucro a setole brevi e scarse. — *Tosc. nella Selva Pisana e Salernit. nel Cavese (LEOPOLDO M.). Magg. Giu.* α TYPICA

B Fusti in alto e peduncoli provvisti di abbondanti setole nerastre glandulifere. Involucro a setole più lunghe e più copiose. — *Puglie al Gargano tra S. Marco e S. Nicandro (MARTELLI in hb. flor.!), presso Otranto ed a Leucasipide (GROVES!). — An C. fuliginosa S. et S.?* — *C. Suffreniana* Groves β APULA NOB.

+ Acheni lunghi $2\frac{1}{2}$ -3 mm., attenuati in rostro lungo $\frac{1}{4}$ circa del loro corpo. Fusti glabri, pubescenti o setolosi in basso. Vedi *C. NEGLECTA*