

## CREPIS (L. Sp. 914).

*Barckhausia* Mænoch Meth. 537. — *Ætheorrhiza*, *Phæcasium*, *Omalocline*, *Brachydercea*, *Gatyona* et *Nemauchenis*, Cass. Dict. — *Endoptera* D.C. Prodr. VII, 178. — *Geracium* Rchb. — *Soyera* Monnier.

Capitulum multiflorum. Involucrum calyculatum vel subimbricatum. Receptaculum nudum breviter villosum vel glabrum. Achenia sæpius conformia tereti-columnaria vel subprismatica interdum compressiuscula 10-30-striata apice attenuata vel rostrata, rarius marginalia dissimilia. Pappi albi setæ plerumque molles flexiles. — Herbae annuæ vel perennes, habitu variæ.

*Specierum Orientalium distributio.*

SECT. I. EUCREPIS. — Achenia subconformia apice plus minus attenuata sed nunquam rostrata.

## A. PERENNES.

§ 1. **Bulbosæ.** — Rhizomatis rami tuberiferi.

*C. bulbosa.*

§ 2. **Fusifformes.** — Radix fusiformis verticalis.

\* Normaliter pleiocephalæ.

*C. Sibirica, Djimilensis, rigida, ciliata, auriculæfolia, sonchifolia, incana, Khorassanica, divaricata, Sibthorpiana, Raulini, macropus, crocifolia, Athoa, Sahendi, Huetii, fœtens.*

\* \* Monocephalæ.

*C. heterotricha, alpestris, pinnatifida, robertioides.*

§ 3. **Præmorsæ.** — Rhizoma præmorsum fibrosum.

\* Humiles alpinæ, caule scapiformi mono-vel rarius dicephalo.

*C. Armena, Bithynica, Columnæ, Elbrusensis, dioritica, Olympica.*

\* \* Elatæ corymbosæ.

*C. rumicifolia, Ruprechtii, glabra, Smyrneæ, Sieberi, Hierosolymitana, willemetioides, Reuteriana, præmorsa.*