

B. MONOCARPICÆ.

§ 4. **Sclerophyllæ.** — Involucri phylla interna fructifera indurata nervo incrassato.

C. pulchra, Kochiana.

§ 5. **Malacophyllæ.** — Involucri phylla fructifera immutata.

C. tectorum, biennis, Nicæensis, virens, parviflora.

SECT. II. BARCKHAUSIA. — *Barckhausia* Mæench. — Achenia subconformia (Confer *C. Burenianam*), omnia vel centralia manifeste rostrata.

* Flores lutei.

+ Pedunculi virginei nutantes.

C. neglecta, Cretica, pterothecoides, fallax, foetida, Bureniana, Kotschyana, senecioides, Arabica.

+ + Pedunculi virginei erecti.

C. setosa, vesicaria, Marschallii, alpina.

* * Flores rosei.

C. rubra.

SECT. III. GATYONA. — *Gatyona* et *Nemauchenes* Cass. — *Endoptera* D.C. — Achenia apice attenuata vel rostrata, radii facie ventrali carinata vel alata.

* Achenia radii apice attenuata

C. multiflora, Dioscoridis.

* * Achenia radii rostrata.

C. aculeata, aspera.

SECT. I. EUCREPIS.

§ 1. **Bulbosæ.**

1. **C. bulbosa** (L. Sp. 1122 sub *Leontodonte*) rhizomatis ramis elongatis filiformibus tuberiferis, collo stolones filiformes repentes remote foliosos edente, foliis glabris viridibus carnosulis oblongo-lan-