

CREPIS (L. Sp. 914).

Barckhausia Mænoch Meth. 537. — *Ætheorrhiza*, *Phæcasium*, *Omalocline*, *Brachyderæa*, *Gatyona* et *Nemauchenes*, Cass. Dict. — *Endoptera* D.C. Prodr. VII, 178. — *Geracium* Rchb. — *Soyera* Monnier.

Capitulum multiflorum. Involucrum calyculatum vel subimbricatum. Receptaculum nudum breviter villosum vel glabrum. Achenia sæpius cōnformia tereti-columbãria vel subprismatica interdum compressiuscula 10-30-striata apice attenuata vel rostrata, rarius marginalia dissimilia. Pappi albi setæ plerumque molles flexiles. — Herbæ annuæ vel perennes, habitu variæ.

Specierum Orientalium distributio.

SECT. I. EUCREPIS. — Achenia subcōnformia apice plus minus attenuata sed nunquam rostrata.

A. PERENNES.

§ 1. **Bulbosæ.** — Rhizomatis rami tuberiferi.

C. bulbosa.

§ 2. **Fusifformes.** — Radix fusiformis verticalis.

* Normaliter pleiocephalæ.

C. Sibirica, *Djïmilensis*, *rigida*, *ciliata*, *auriculæfolia*, *sonchifolia*, *incana*, *Khorassanica*, *divaricata*, *Sibthorpiana*, *Raulini*, *macropus*, *crocifolia*, *Althoa*, *Sahendi*, *Huetii*, *fætens*.

* * Monocephalæ.

C. heterotricha, *alpestris*, *pinnatifida*, *robertioides*.

§ 3. **Præmorsæ.** — Rhizoma præmorsum fibrosum.

* Humiles alpinae, caule scapiformi mono-vel rarius dicephalo.

C. Armena, *Bithynica*, *Columnæ*, *Elbrusensis*, *dioritica*, *Olympica*.

* * Elatæ corymbosæ.

C. rumicifolia, *Ruprechtii*, *glabra*, *Smyrnea*, *Sieberi*, *Hierosolymitana*, *willemetioides*, *Reuteriana*, *præmorsa*.