

Contribution à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord

Fascicule 24 (*suite et fin*)

par le Dr R. MAIRE.

2074. **Hedypnois arenicola** Sennen et Mauricio in Sennen, Pl. d'Espagne, n° 9457 — Cette plante, distribuée du Rif par SENNEN, est identique à *H. sabulorum* Pomel [*H. cretica* (L.) Willd. var. *gracilis* (Batt. Fl. Alg. p. 531)].

2074 bis. **Picris tenuis** Caball. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 28, p. 34 — Cette plante est une forme extrême de *P. cupuligera* (Dur.) Walp.

2075. **Crepis taraxacifolia** Thuill. var. **ramosissima** Maire, Contr. 522, pro var. *C. tingitanae* (Salzm.) Ball — A var. *genuina* Willk. recedit capitulis majoribus (usque ad 12×13 mm); ramis inflorescentiae pilis atro-olivaceis glandulosis numerosis hispidulis; anthodii phyllis internis atro-virentibus, vix villosulis (nec villosis canescentibus), pilis glandulosis olivaceis l. atro-olivaceis vestitis.

Maroc occidental : fentes des rochers quartzitiques de Camp Boulhaut; pâturages argilo-sableux à Skhirat.

var. **sulphurea** Maire et Wilczek, n. var. — Ab aliis varietatibus differt corollis pallide sulphureis. Radix biennis. Folia basalia parce pilosa l. glabra margine tantum setosa, plus minusve runcinata. Planta a basi ramosa; caules adscendentes, glabri, ramosi, parce foliati foliis linear-lanceolatis basi saepius dentatis auriculatis, supremis integris. Rami inflorescentiae parce albido-villosi. Anthodia $10-11 \times 5$ mm, phyllis externis lanceolato-linearibus margine vix scariosis, basi albo-lanuginosis; internis dorso albo-lanuginosis.

Anti-Atlas occidental : pâturages rocheux et cultures dans le massif du Kest et la vallée des Azour Ighallen, sur les grès, 800-1600 m (MAIRE et WILCZEK).

En fleurs en avril.

2076. **Hypochoeris radicata** L. ssp. **heterocarpa** (Moris) Maire var. **setulosa** Maire et Sennen, n. var. — Anthodii phylla dorso setis 1-seriatis hispida.

Rif (SENNEN et MAURICIO). Anti-Atlas occidental : massif du Kest, 800-1500 m (MAIRE et WILCZEK).