

Cichorium.**C. pumilum** Jaq.; Ball, Spicil.

Tánger, Tetuán.

Hyoseris.**H. baetica** C. H. Schulh.=*H. radiata* Ball, Spicil., pág. 534.

Tánger, frecuente.

Tolpis.**T. barbata** Gaertn.; Ball, Spicil.=*Drepania barbata* Juss.; Weyler, Catál.

Tetuán.

Rhagadiolus.**R. edulis** Gaertn.

Beni Hozmar.

Hedypnois.**H. coronopifolia** Ten.

Tetuán.

Helminthia.**H. echioides** Gaertn.; Ball, Spicil.

Tánger.

H. comosa Boiss. var.

Laucien. Los ejemplares recogidos lo fueron en un estado algo atrasado para decidir si se trata de una variedad diferente del tipo español, por las hojas menos espinosillas. Esta novedad específica para la flora de África nada tiene de extraordinaria, cuando se da en las costas béticas.

Crepis.**C. tingitana** Ball, Spicil., pág. 537.

Yebel Quebir, descendiendo al Cabo Espartel, y en las rendijas de los peñascos.

C. taraxacifolia Thuill. forma **recognita** Hall. (sub sp.).

Tánger. No parece ser más que una planta humilde y sin hojas caulinas, producida por la aridez y sequedad del suelo.

var. **tangerina**.

Tánger.

Folia viridia glabra *C. intybaceae* Brotero, capitula farinosa.

Ball se refiere probablemente a esta forma, cuando dice: «Forma Maroccana *C. taraxacifoliae* habitu proprio potius quam caractere technico, distinguenda.»

La *C. intybacea* Brotero y su variedad *Haenseleri*=*C. Haenseleri* Boiss.=*C. taraxacifolia* Thuill. var. *Haenseleri* Boiss. se aparta de la planta tangerina, por ser ésta más humilde y parecida a la *C. recognita*, cabezuelas canescentes y el dorso de las escamas suele venir con algunos pelos rígidos y negruzcos, por más que en algunos pies falten por completo estas cerdas. La *C. intybacea* Brot. nos parece una raza del tipo.

C. bulbosa Tausch.; Ball, Spicil.

Tánger.

Andryala.

A. integrifolia L.; Ball, Spicil.

Frecuente desde Tánger al Rincón de Medik.

Hypochoeris.

H. Salzmanniana DC.=*H. glabra* L. var. *Salzmanniana* Ball, Spicil.

Tánger, praderas marítimas. Por el hábito de *H. maculata* es notablemente distinta de la *H. glabra*.

H. radicata L. var. **heterocarpa** Mor.; Ball, Spicil.

Yebel Quebir.

H. platylepis Boissier, Voy. bot., pág. 376.

No parece ser escasa en las cercanías de Tánger. Especie poco conocida y muy notable, porque «l'involucre rappelle en quelque manière, par sa coloration, celui du *Picridium tingitanum*», según escribió Boissier. Este carácter de las escamas consiste en un margen ancho y escarioso, que la distingue francamente de la *H. radiata*, que trae las escamas angostamente escariosas.

Seriola.

S. aethnensis L. forma **melanotricha**=*Hypochoeris*, Ball, Spicil.

De Tánger al Fondak.