

986. **Lactuca Thirionii** Lévl., nov. spec.

Rhizomate lignoso, 1 cm diametro, foliis pinnatis, lobis inaequalibus obtusis, bracteis involucri viridibus margine hyalinis linearibus, akoeniis nigris fusiformibus striatis, rostro brevi et crasso sed distincto dignoscitur. Flores violacei.

Kouy-Tchéou: Ra-Ouai-Ho, 15 mai 1910, 600 m (Jos. Esquirol, 2126).

987. **Crepis pseudo-virens** Lévl., nov. spec.

Perennis. A *Crepide virente* differt caule circiter 10 cm alto, nudato; involucro glabro; akoenis longe rostratis, striatis; rostro filiformi. Ceterum habitus var. *diffusae Crepidis virentis*.

Yun-Nan: Collines et plaine à Tong-Tchouan, 2500 m, mars 1911 (Maire).

988. **Gynura spermaptera** Lévl., nov. spec.

Multiceps; folia in eadem planta polymorpha, runcinata vel spatulata; caules apice nudi; flores rubri; bractee involucrales obovatae acutae, flores aequantes; akoenia prismatica tetraptera; pappus densus, niveus akoenio triplo longior.

Affinis *G. pinnatifidae* Vant.

Kouy-Tchéou: Lou-Fou, jardin, nov. 1910 (Jos. Esquirol, 2570).

989. *Crepis taraxacifolia* Thuill. var. **Vanioti** Lévl., nov. var.

Affinis *C. taraxacifolia* Thuill.; differt tamen capitulis minoribus, bracteis involucri glabris et akoeniis valde lucidis.

Pé-Tchi-Li, 1904 (Chanet, 531). Importé.

990. **Crepis Chanetii** Lévl., nov. spec.

Caulis erectus, costato-striatus, glaber, folia radicalia subnulla vel nulla; folia lanceolato-linearia, glabra uninervia, integra vel remotissime grosse dentata, inferiora alato petiolata, superiora sessilia; flores lutei; bractee involucrales glabrae, lineares dimidium pappum aequantes; akoenia grisea glabra costata; pappus niveus.

Pé-Tché-Ly: Fossés à Ting-Tchéou, mars-novembre 1909 (Chanet, 439).

991. **Inula Esquirolii** Lévl., nov. spec.

Caulis erectus, robustus, 1,50–2 m altus, hirtus, insigniter basi et apice hispidus, pilis verticis densis et fulvis: folia elongata rigida lanceolata sessilia vel alato-petiolata ciliata margine revoluta; bractee inflorescentiae foliaceae dentatae; involucri foliola pluriseriata inaequalia, interna angusta acuta; externa lanceolata villosa; akoenia villosa cylindrica; pappus sordide albidus. Flores albi.

Kouy-Tchéou: Lo-Fou: route de Pien-Yang, nov. 1905 (Cavalerie, 2687); steppes et prairies (Jos. Esquirol, 808, 2700).

992. **Aster? Marchandii** Lévl., nov. spec.

Caulis 4-sulcatus; folia ovata, glabra, nervosa alato-petiolata breviter et abrupte acuta, remota; inflorescentia divaricata depauperata; flores albi; foliola involucri linearia obtusa, glabra; flores tubulosi, lobis brevibus; ligulae elongatae.