

392. CREPIS (polymorpha) caule ramoso , foliis variis , radicalibus oblongis , sinuatis ; caulinis hastatis pinnatis , runcinato-pinnatifidis , amplexicaulibus ; rameis linearibus subulatis , dentatis ; calycibus tomentosis margine scariosis. 24.

A Fontfroide , Laredorte , &c. Dans les prés , les lieux couverts & les endroits stériles. Cette différence de sol donne à cette plante un port quelquefois si singulier , que l'on seroit tenté d'en séparer les variétés , si une observation constante & réfléchie ne nous avoit convaincu que cette espece est sujette à prendre des formes très-variées.

624. CREPIS (taraxacoïdes) caule subramoso folioso sulcato ; foliis variis dentato-sinuatis ; calycibus laxis membranaceis ; radiis magnis. 24.

Au Mont-Alaric , près de Narbonne. Nous avons mal-à-propos rapporté autrefois cette plante au genre d'*Hypochæris*.

393. CUCUBALUS (maritimus) procumbens ramosus foliis ovalibus utrinque pilosis , capsulis obtusis. 24. *Lichnis maritima anglica*. LOB. ic. 337.

Dans les lieux saumâtres.

407. CYTISUS (villosus) foliolis ovalibus , obtusis , lanuginosis , intermedio maximo. 5.

Aux environs de Narbonne , à Fontlaurier.

408. CYTISUS (virgatus) foliolis acutis æqualibus , leviter incanis ; caule erecto flaccido , ramis elongatis striatis. 5.

Cytisus incanus siliquâ longiore. TOURNEF. 468.

Cette espece se trouve dans les mêmes lieux que la précédente.