

Bereketli, Steppe am Weg, 1800 m (27. VIII. 1938; no. 409).

Reichardia picroides (L.) Rth. — Boiss. fl. Or. III, 828
(*Picridium vulgare* Dsf.).

Bereketli-Maden, 1600 m (29. VIII. 1938; no. 426).

Crepis tauricola Bornm. (spec. nov.). — Sectio *Eucrepis*. — Perennes. — Fusiformes. — Monocephalae. — Boiss. fl. Or. III, 831, 839—841.

Perennis, radice verticali, in glareosis immersa valde elongata, albida, remote squamosa, collo cespitoso-multicipite; foliis omnibus radicalibus, utrinque dense pilis crassis curvatis glanduliferis setisque longioribus eglandulosis intermixtis obsitis, opaco-viridibus, lamina ovata vel ovato-oblonga, obtusa, abrupte in petiolum longum subspathulatim attenuata, lateraliterque praesertim petiolum versus leviter repando-dentata (dentibus utrinque 1—2), petiolo aequilongo vel ea duplo longiore suffulta; caulibus scapiformibus, brevibus monocephalis, 2 cm longis, folia vix superantibus, patule glanduloso-pilosis; capitulo mediocri, absque flosculis 8—10 mm longo et 4—5 mm lato, undique adpresse araneoso cano, pilis glanduligeris parce obsito; phyllis lanceolatis acutiusculis, externis brevissimis quam interna inter se aequilonga 4—5-plo brevioribus adpressisque; ligulis corollinis involucre sesqui-longioribus; acheniis tenuiter striatis; pappo niveo, 5 mm longo.

In der Gipfelregion des Ala Dag, 3100 m (23./24. VIII. 1938; no. 325, 298).

Unter den zahlreichen Stücken befindet sich eine Pflanze (no. 325) mit etwas größeren, gegen den Stiel hin mit je einem Fiederlappen versehenen Blättern; auch ist einer der Blütenstengel gegabelt (f. *furcata* Bornm.). — Im übrigen ist *C. tauricola* eine durch die Blattgestalt, die lebhaft an Formen (d. h. mit verkürzter Blattfläche) von *Bellis perennis* erinnert, eine sehr gut gekennzeichnete Spezies, die zu irgendeiner anderen europäischen bzw. orientalischen Art keine näheren Beziehungen aufweist.

Crepis dioritica (Schott et Ky. exsicc.) Boiss. fl. Or. III, 842.

Ala Dag, bei 2400 m (3. IX. 1938; no. 1043). — Nur ein Individuum (blühend) angetroffen.

Crepis pinnatifida (Willd.) Fröhl. — Boiss. fl. Or. III, 840.

Ala Dag, bei 3100 m (24. VIII. 1938; no. 407) zahlreiche Exemplare (blühend; übereinstimmend mit Woronow, Fl. Caucas. von Artwin no. 6144).

Hieracium procerigenum Litw. et Zahn (*H. procerum-pannosum*).

Ala Dag (ohne nähere Angaben [no. 472]); bereits stark verblühtes Exemplar, kaum sicher zu bestimmen.

Hieracium pannosum Boiss. — Boiss. fl. Or. III, 869.