

vata runcinato-dentata. Caulis basi foliosus sulcatus hispidus superne nudus corymbosus. Folia caulinis amplexicaulia lanceolata inferiora dentata, dentibus basin versus majoribus, superiora integerrima. Bracteae ovato-oblongae concavae membranaceae. Calyces tomentosi, squamis exterioribus subrotundo-ovatis membranaceis calyce duplo brevioribus patentibus. W.

*7. CREPIS scariosa. W. †

C. foliis lanceolatis runcinatis hirtis, caule folioso, floribus corymbosis, calycinis squamis exterioribus membranaceis scariosis longitudine calycis. W.

Crepis vesicaria β. Sp. pl. 1132.

Cichorium pratense hirsutum vesicarium. Bauh. pin. 126.

Cichorium sylvestre vesicarium pratense. Colum. ecp. 1. p. 238. t. 237.

Spreuertiger Pippau. W.

Habitat in Apulia. ◎

Planta a praecedente diversissima. Differt enim caule folioso, foliis lanceolatis omnibus runcinatis, squamis calycinis exterioribus membranaceis scariosis obtusis longitudine calycis, radice annua. W.

*8. CREPIS taurinensis. W.

C. foliis scabris radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis lanceolatis amplexicaulis basi dentatis, calycibus subtomentosis, squamis exterioribus margine membranaceis. W.

Crepis vesicaria. Balbis taur. p. 93. (excluso synonymo.)

Turinischer Pippau. W.

Habitat in collibus Taurinensibus. ◎ (v. f.)

Folia radicalia Raphani runcinato-lyrata; caulinis linearis-lanceolata auriculato-amplexicaulia basi dentata. Flores corymbosi. Bracteae linearis-subulatae. Calyces subtomentosi squamis exterioribus lanceolatis calyce duplo brevioribus, margine tantum membranaceis. A C. vesicaria et scariosa distincta. Bracteis Calycibusque exterioribus non scariosis lanceolatis, Foliiisque radicalibus runcinato-lyratis diversissima. W.

9. CREPIS alpina.

C. foliis ovatis cordato-sagittatis amplexicaulis den-