

2124 (6). *L. sagittata* W. et K. — **С. стреловидный** (*L. altissima* M. B.).

Стебель высокий, прямой, толстый, полый, бороздчатый, коричневатого или желтовато-зеленый. Прикорневые (1 года) листья, суженные в черешок, цельные или струговидно-раздельные, с крупной яйцевидной конечной долей, стеблевые листья сидячие с острым стреловидным окончанием, цельные, по краю остро-или мелко-зубчатые, эллиптически-ланцетные или ланцетные, суженные к основанию. Корзинки в узкой наверху щитковидной метелке. Листочки обертки голые, от коротко-ланцетных наружных до длинно-линейно-ланцетных внутренних. Семянки черные, сжатые, с узким краем и 2—5 ребрышками на каждой стороне, вдвое длиннее черного же носика. ☉. 60—100. VI—VII.

В лесостепной и степной области в лиственных лесах Поволжья.

I. А. Сызранский у., д. Подгоры (Коржинский). II. А. Пады, Балашовского у. (Траншель). Б. Саратовский, Камышинский уу. (Келлер). В. Красноармейск (Беккер).

Род 663. *CREPIS* L. — **СКЕРДА**¹

Корзинки с оберткой из наружных более коротких и внутренних более длинных листочков, расположенных однорядно. Цветоложе голое или шершавое. Семянки цилиндрические, иногда с длинным носиком, с продольными ребрышками. Хохолок из простых белых волосков. Цветы желтые.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Все листья прикорневые | 5. | C. praemorsa Tausch. |
| + | Кроме прикорневых, есть и стеблевые листья. | 2. | |
| 2. | Срединные сеянки с длинным носиком | | |
| | | 6. | C. foetida L. ssp. rheadifolia (M. B.) Schinz et Keller. |



Фиг. 722. *Lactuca saligna* L.

¹ Обработал И. М. Крашенинников.

2128 (4). *C. tectorum* L. — С. кровельная. Стебли голые или несколько войлочно-опушенные, простые, в верхней части ветвистые. Прикорневые листья ланцетные, к основанию суженные, в различной степени выемчато-зубчатые, нижние стеблевые ланцетно-линейные или линейные, также более или менее выемчато-зубчатые, сужены в черешок, средние со стреловидным основанием, стеблеобъемлющие, верхние линейные, с завернутыми цельными краями; иногда все листья цельные, линейные. Корзинки мелкие, в метельчатом соцветии на несколько утолщенных сверху ножках; реже корзинки одиночные. Листочки обвертки голые или войлочно-пушистые, иногда кроме того с отстоящими черноватыми железистыми волосками; наружные листочки линейно-нитевидные, отстоящие, внутренние — линейно-ланцетные, заостренные. ☉. 15—60. V—IX.

Обычное растение во всех областях нашей флоры, на полях, в посевах, вдоль дорог, в огородах, около домов, иногда на степных склонах, в сосновых лесах, на засоренных лугах.

Ssp. *astrachanica* (Stev.) H. Krasch. (*C. astrachanica* Stev. in herb.). Стебли многочисленные, 5—15 см высоты, тонкие. Прикорневые листья в густой розетке, более или менее сильно волнисто-зубчатые от ланцетных до ланцетно-линейных; стеблевые линейные, обычно без ушков или со слабо выраженными ушками. Корзинки мелкие, колокольчатые, расположенные на длинных ножках, одиночно или по 2—4. Листочки обвертки часто, как и верхняя часть ножек, паутинисто-пушистые, иногда кроме того с жесткими щетинистыми волосками.

III. Б. Еютаевск (Семашко); Астрахань (Беккер); берега пресного озера Тинаки в окр. Астрахани (Ильин, Григорьев).

2129 (5). *C. praemorsa* Tausch. — С. обгрызанная. Голые или покрытые волосками растения. Стебли простые, единичные, глубоко-бороздчатые, лишенные листьев. Прикорневые листья немногочисленные, собранные при основании стебля в розетку, продолговатые или продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, при основании суженные в короткий черешок, слабо выемчато-зубчатые, иногда цельнокрайние. Корзинки собраны в кистевидной метелке, мелкие, цилиндрически-колокольчатые. Наружные листочки обвертки узколанцетные, внутренние более длинные, линейные узкопленчатые. Семянки вдоль слабо-ребристые, цилиндрические, в верхней трети немного суженные. Хохолок снежно-белый, по длине равный семянке. Цветы светложелтые. ☉. 15—60. VI—VII.

Довольно обычно в лесостепи и северной части степной области на луговых степях, лесных лугах, в лиственных лесах, в сосновых борах.

2130 (6). *C. foetida* L. ssp. *rheoadifolia* (M. B.) Schinz et Keller. — С. волючая. Стебель невысокий, ветвистый, тонко ребристый. Все растение более или менее густо покрыто жесткими щетинистыми отстоящими волосками. Стебель ветвистый, тонко-ребристый. Листья ланцетные, нижние строго-