

aigrette très blanche, un peu plus courte que l'achaine. 2. — Juillet-août.

HAB. — Pâturages des Alpes; Ain : en montant à la Dôle.

AIRE GÉOGR. — Alpes; Apennins; Carpathes; Bosnie.

SECTION VI. — **Intybus** Endl. *Ench.*, p. 291; genre *Intybus* Fries *Novit.*, ed. 2, p. 244. — Achaines à 10 stries; tige nue, terminée par une panicule; calathides petites, jaunes; feuilles obovées, entières ou crénelées, en rosette.

10. — **C. PRÆMORSA** Tausch in *Flora*, 11 (1828), p. 79; G. et G. *Fl. Fr.*, 2, p. 336; Reichb., l. c., 19, t. 93; *Hieracium præmorsum* L. *Spec.*, 1126; *Intybellia præmorsa* Monn. *Essai*, p. 79; *Geracium præmorsum* Reichb. ap. Mossl. *Handb.*, ed. 2, v. 2, p. 1367; *Intybus præmorsus* Fries *Novit.*, ed. 2, p. 245. — Exsicc. : Reichb., 1439; Fries, 13, n° 28; Bill., 143; F. Schultz *Fl. Gall. et Germ.*, n° 133, *Herb. norm.*, nov. ser., 1149; Schultz Bip. *Cich.*, 50; *Soc. Dauph.*, 4947. — Souche tronquée. Plante d'un vert pâle, ord^t ± pubescente. Calathides en panicule racémiforme. Péricline à folioles glabres; les internes allongées, sublinéaires, aiguës; les externes en calicule, courtes, lancéolées ou presque oblongues. Corolles d'un jaune pâle. Achaines d'un gris jaunâtre, à aigrette blanche un peu plus longue qu'eux. 2. — Mai-juillet.

HAB. — Bois et collines de l'est : Alsace; Lorraine; Vosges; Meurthe-et-Moselle; Meuse; Aube; H^{te}-Marne; Côte-d'Or; se retrouve dans la Savoie, au col du Frêne.

AIRE GÉOGR. — Scandinavie mérid.; Finlande; Europe centrale; Italie sept.; Russie méridionale; Bulgarie; Roumélie; Caucase; Sibérie.

SECTION VII. — **Malacophyllæ** Boiss. *Fl. Orient.*, 3, p. 832. — Plantes annuelles ou bisannuelles; tiges feuillées; calathides en panicule ou en corymbe polycéphale; folioles externes du péricline en calicule.

11. — **C. TECTORUM** L. *Spec.*, 1135; G. et G. *Fl. Fr.*, 2, p. 338; Reichb., l. c., 19, t. 91; *C. varia* Moench *Meth.*, p. 534; *C. Dioscoridis* Pollich *Palat.*, 2, p. 399; *Hieracium tectorum* Karsch *Fl. Westf.*, p. 331. — Exsicc. : Ring. *Herb. norm.*, 2, n° 6; Fellm. *Pl. arct.*, 142 et 143; Reichb., 226; Bill., 410; Schultz Bip. *Cich.*, 123; *Soc. Dauph.*, 3805. — Tige de 2-6 décim., simple ou rameuse. Feuilles radicales étalées, oblongues-lancéolées, entières, dentées ou roncinées; les caulinaires moyennes sessiles, sagittées, allongées,

linéaires, à bords \pm révolutes. Calathides petites, en corymbe étalé. Péricline à folioles internes lancéolées, aiguës, pubescentes-blanchâtres et \pm glanduleuses, les externes linéaires. Corolles jaunes; stigmates bruns. Réceptacle presque glabre, alvéolé. Achaines bruns, \pm longuement atténués supérieurement, à 10 côtes hérissées; aigrette blanche, égalant l'achaine. ①. — Juin-août.

β . *segetalis* Roth *Bot. Abh.*, p. 37; *C. stricta* Schultz *Fl. Starg. Suppl.*, p. 41, non Scop. — Tige de 2-3 décim., simple ou 2-4-céphale, grêle; feuilles peu dentées, les caulinaires inférieures ord^t entières, courtes, oblongues.

γ . *gracilis* Wallr. *Sched. crit.*, p. 430; *C. Lachenalii* Gochn. *Dissert. Cich.*, p. 19, t. 3. — Tige de β ., très grêle; feuilles caulinaires toutes entières, linéaires.

HAB. — Murs, toits, lieux sablonneux. — Alsace; Oise; env. de Paris; Bourgogne. — Indiquée par erreur dans le Dauphiné, les Pyrénées et le Gard.

AIRE GÉOGR. — Europe sept. et cent., Espagne, Italie sept., Serbie; Caucase, Sibérie.

Sous-espèce. — **C. barchhausioides** Rouy; *C. tectorum* Savi *Pl. Etruscæ exs.*, non L. — Achaines petits, insensiblement atténués dans leur tiers supérieur, ce qui les fait paraître presque rostrés; calathides plus petites que dans le type; feuilles caulinaires relativement plus courtes et plus larges, peu nombreuses; plante grêle, de 25-35 cent., rameuse, à rameaux allongés, dressés ou peu étalés, subfiliformes.

HAB. — Plante italienne, à rechercher en France.

12. — **C. NICÆENSIS** Balbis *ap. Pers. Syn.*, 2, p. 376; G. et G. *Fl. Fr.*, 2, p. 357 (*excl. syn. Visian.*); Reichb., *l. c.*, 49, t. 89; *C. scabra* DC. *Cat. Monsp.*, p. 99, *Fl. Fr.*, 5, p. 446, non Willd.; *Barchhausia Nicæensis* Spreng. *Syst.*, 3, p. 653; *Brachyderæa Nicæensis* Schultz Bip. *Cich.*, Suppl., n° 121. — Exsicc. : Reichb., 2350; Fries, 3, n° 3; Bill., 268; *Soc. Dauph.*, 844. — Tige de 3-6 décim., rameuse, hérissée (surtout inf^t). Feuilles radicales pétiolées, oblongues-lancéolées, roncinees, hérissées-rudes; les caulinaires sessiles, planes lancéolées, sagittées, à oreillettes divergentes, acuminées; les inférieures pinnatifides; les supérieures entières. Calathides médiocres, en panicule dressée ou peu étalée. Péricline à folioles sublinéaires, aiguës, pubescentes-blanchâtres et parfois