

va och slåta: alltid i brädden tandade. Bl.skaften i början ludna, bli sedan bara. Är mycket mjölkfastig. H:n (k.II. g.I. f.I. h.II. f.II. b.II.) — utomlands pläckas vintertid desfs späda telningar til fallat och kål.

- 3 — *alpinus* (Jerja-S.) Bl.skaften häriga och med et eller annat blad-fjäll (sqvamofi.) Bl:erna fitta i klase ell:r bl.vippa: Bladen rundtaggade. ☉. v. i Norra W-botu och Lappl. Bl. i Jul. Aug. med vackra blå bl:r. Har hög, bladig stjerk. Bladen likna *Prenanth. muralis*: ha merendels den yttre fliken större; zangelformig: sidoflikarne snärre. Ibland variera bladen uptil nästan rundtaggade, nedtil lyrtaggade, och i brädden små-tandade. Bl.skaften stråfbärige, ofta utan fjäll med et smalt bl.skärm vid hvardera skaftet; *Sonch. canadensis*? S. V. H:n (k.I. g.I. f.II. h.II. f.I.) — åten af kor fätter den besk smak på mjölken. Desfs färlika afskalade stjerkar åtas af Lapparne. Kl:s Tolta i Jemtl. Tota Dalarne.

- 4 — *sibiricus* (Blå-S.) Bl.skaften fjällige: bladen lanfettl. odelta och utan skaft. ♀. v. i Ångermanland &c. r. Bl. i Jul. med vackra blå bl:r. Bladen äro glatta och tandade.

A) med helbräddade blad: grenig Bl.vippa. r.†.

385. CREPIS. KREPE.

- 1 *C. tetorum* (Hus-K.) Bladen slåta, uptil smala, lanfettl. nedtil rundtaggade, utan skaft. ☉. v. vid byar a. Bl. i Jun. Aug. med ljusgula bl:r; Varier. mycket med olika blad. De öfverste äro jämsmåla ofta helbräddade; Bl.fodr. klubb-hårigt. H:n (k.I g.I. f.I. h.I. f.I. b.II.)

A) *pumila* med odelta blad vid roten, se fig. 51. v. på Öland. r.

2. — *biennis* (Fält-K.) Bladen groft-tandade (nästan lyrtaggade) och stråf-håriga: Bl.fodr. färat och längs efter styfhårigt (*muricatus*.) ♀. v. på öppna fält i Skåne. r. Bl. i Jul. Aug. med gula bl:r. H:n okänd.

386 PRENANTHES. STENSTUPA.

- 1 *P. muralis* (St.) har 5 små blomster innom bl.fodret: Bladen rundtaggade (eller något spjutlikt flikiga.) ♀. v.