

terminales, uniflori, *Flos* pallide luteus, minor quam in antecedentibus. *Calyx* imbricatus: *foliis* lanceolatis, carinatis, apice rubellis. *Semina* oblonga, acuminata, pappo longo, sessili, plumoso, rufescente coronata.

Variat in locis sterilioribus siccis *Foliis* integris.

C R E P I S.

Observ. Differt a *Scorzonera* *Calyce* calyculato et pappo piloso.

Flor. Germ. p. 335. n. 1. CREPIS foetida.

C. foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis. LINN. Syst. Plant. T. III. pag. 650. IACQ. Vind. p. 140.

C. foliis hirsutis pinnatis, pinnis angulatis alterne majoribus. ZINN. Goett. p. 429.

C. hieracioides foliis pinnatis, pinnis alterne majoribus, triangularibus, floribus ante expansionem nutantibus. HALL. Gott. pag. 410.

Hieracioides vulgaris foetida. BERGEN Flor. Francof. pag. 267.

Hieracium amygdalas amaras olens seu odore Apuli suave-rubentis. BUXB. Halens. p. 158. RUFF. Ien. n. 198.

Hieracium luteum Cichorei sylvestris folio, amygdalas amaras olens. HOPPE Flor. Ger. p. 121.

Odor totius plantae gravis. *Caulis* pedalis et major, erectus, angulatus, scaber, ramosus. *Folia* dentata, canescentia, pilosa, scabra: *radicalia* in cespitem disposita, petiolata, obtusiuscula, pinnata: *pinnis* recurvis, denticulatis; *caulina* alterna, amplexicaulia, pinnatifidis, acuminatis. *Pedunculi* longi, nudi, foliolo lineari, exiguo, integerrimo plerumque in medio praediti. *Flores* flavi, ante florescentiam nutantes. *Calyx* incanus, villis mollissimis obsessus. *Semina* oblonga in stipitem longiorem superne attenuata, pappo piloso coronata.

Flor. Germ. p. 335. n. 2. CREPIS rectarum.

C. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus laevibus: inferioribus dentatis. LINN. Syst. Plant. T. III. p. 652. DOERR. Nass. pag.

p. 90. ELWERT Flor. Margg. av. Baruth. p. 18. LACQ. Vind. [p. 141. NONNE Erf. p. 106. PLAN. Erf. p. 209. SCOP. Carn. ed. 2. n. 954. TIMM. prodr. Flor. Megapol. n. 519. WEIGEL Flor. Pom. n. 504. WILKE Flor. Gryph. n. 419.

Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis. BOEHM. Lips. n. 213.

Hieracium majus erectum angustifolium, caule laevi. C. BAUH. pin. p. 127. BUXA. Halens. p. 156. RUPP. Ien. p. 198.

Hieracium luteum glabrum seu minus hirsutum. JON. BAUH. hist. 2, p. 1024. DILL. Gies. p. 95.

Hedypnois Plinii et Aphaca Theophrasti, Cichorium luteum pratense dentis leonis flore, hieracii folio. LOBEL Icon. p. 129.

Hieracium Chondrillae folio glabrum? C. BAUH. pin. pag. 127. DILL. Gies. p. 139.

β. segetalis.

Crepis hieracioides β. foliis imis parum dentatis, superioribus pene integris. HALL. Goett. p. 312. Botan. Abhandl. und Beobacht. pag. 37. n. 34.

Caules plures plerumque ex una radice, erecti aut basi paululum declinati, pedales, bipedales et majores, sulcati, glabri, nitidi, ramosi. *Folia* glabra, lanceolata: *radicalia* in cespitem congesta, sinuato-dentata: *caulina inferiora* runcinata, dentata, dentibus longis angustis; *caulina superiora et ramea* sagittata, basi plerumque dentata. *Caulis* superne corymbosus, multiflorus. *Flores* lutei, omnes erecti. *Calyx* calyculatus, incanus, pubescens. *Semina* oblonga, brevia, striata, pappo sessili piloso coronata.

Variat 1. *Caule semipedali.*

2. *Caule foliisque hirsutis.*

Crepis Hieracioides foliis semipinnatis subasperis amplexicaulibus, caule hispido folioso et multiflora. HALL. Goett. p. 412. ZINN. Goett. p. 428.

Hieracium Chondrillae folio, hirsutum. C. BAUH. pin. p. 127. BUXA. Halens. pag. 156. DILL. Gies. p. 140. HORRE Flor. Ger. p. 121.

Hiera-

Hieracium luteum hirsutum, aliis Cichorium luteum hirsutum. RUPP. Ien. p. 201.

Hieracium aliis Cichorium luteum hirsutum. IOH. BAUH. hist. 2. p. 1024.

β. segetalis.

Haec planta, quam in *Botan. Abbandl.* l. c. descripsi, toto habitu longe aliena observatur a *Crepide tectorum* et pro specie diversa facile haberi posset. *Caulis* erectus, simplex, superne tantum divisus, pauciflorus, angulosus, hirtus, raro ultrapedalis. *Folia* semiamplexicaulia, glabra: *radicalia* ovato-lanceolata, hinc inde dentata; *caulina inferiora* lanceolata, sessilia, versus basin angustiora, integerrima, in medio uno alterove dente praedita; *superiora et ramea* integerrima, subsagittata, margine revoluta. *Pedunculi* longi (superiores longiores) uniflori, superne increffati, *bractea* exigua plerumque praediti. *Calyx* angulosus, adpersus pilis capitatis, nigricantibus.

Flor. Germ. p. 336. n. 3. CREPIS *biennis*.

C. foliis runcinato-pinnatifidis scabris; basi superne dentatis, calycibus muricatis. LINN. Syst. Plant. T. III. p. 653. DOERR. Nass. p. 90. ELWERT Flor. Marggrav. Baruth. p. 18. IACQ. Vind. p. 141. TIMM. prodr. Flor. Megap. n. 520.

Hieracium, Chondrillae folio, maximum, asperum. C. BAUH. pin. p. 127. prodr. p. 64.

Hieracium, erucae folio, hirsutum. IOH. BAUH. hist. 2. pag. 1025.

Differt a *Crepide tectorum* 1. *Caule* plerumque altiore, saepe tri-quadripedali, inferne minus ramoso, magisque scabro. 2. *Foliis omnibus* pinnatifidis dentatis, subtus praecipue hispidis. 3. *Floribus* triplo vel quadruplo majoribus. 4. *Calyce* muricato, obtusiore.

Flor. Germ. p. 336. n. 4. CREPIS *virens*.

C. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subto-mentosis. LINN. Syst. Plant. Tom. III. pag. 653.

C. *stricta*? SCOP. Carn. ed. 2. n. 956. Tab. 47.

Hic.