

Großblättriger Pippau. W.

Habitat in Algeria ad agrorum limites.

Caulis sesqui- vel bipedalis erectus striatus ramosus pilosus scaber. Folia hirsuta pitis brevibus, inferiora 6 vel 8-petlicaria inaequaliter dentata, superiora lanceolata amplexicaulia. Flores numerosi corymbosi. Pedunculi inaequales uniflori. Flos magnitudine *C. biennis*. Calyx calyculatus, exterior latus glaber, squamis ovatis margine membranaceis, interior cylindricus, foliolis linearibus acutis subaequalibus brevissime hirsutis. Ligulae flavae. Semen elongatum tenne glabrum fuscum. Pappus simplex niveus stipitatus. Receptaculum nudum. Affinis *C. bienni*, differt foliis inferioribus ovato-oblongis latioribus dentatis, nec runcinato-pinnatis, pappo stipitato. Desf. l. c.

* 30. *CRÉPIS coronopifolia.*

C. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus, radicalibus dentatis, caulinis integerrimis, caule paniculato, calycibus tomentosis, exterioribus adpressis. W.

C. (coronopifolia) glaberrima, foliis pinnatifidis, foliolis linearibus, caule erecto paniculato, pedunculis filiformibus, calycibus farinosis. Desfont. Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. p. 38. t. 9. *

C. (succulenta) foliis pinnatifidis dentatisve subcarneosis laevibus, calycibus subtomentosis, pappo sessili. Att. Kew. 3. p. 128.

Chondrilla (hieracioides) foliis caulinis pinnato-multifidis, pedunculorum bracteis aculeiformibus, floribus subcorymbosis, pappo sessili subplumoso. Roth. catalect. bot. 1. p. 101. *

C. coronopifolia ovarii praelongis. Vaill. act. paris. 1721. p. 196.

Chondrilla tragopogonoides. Bocc. mus. t. 13.

Schlitzblättriger Pippau. W.

Habitat in Canariis. ☉ (v. v.)

* 31. *CRÉPIS tenuifolia.* W.

C. foliis pinnatis, foliolis filiformibus, radicalibus dentatis, caule paniculato, calycibus pubescentibus, exteriore reflexo. W.

Feinblättriger Pippau. W.

Habitat in Tauria. 2? Boeber.

Folia radicalia pinnata, pinnis filiformibus basi dente uno alterove notata. Caulis paniculatus. Folia caulina infima pinnata, pinnis filiformibus; superiora et summa filiformia. Calyces pilis brevibus sparsis obsiti, squamis exterioribus reflexis. Valde similis praecedenti, sed tenuitate foliorum, calyceque exteriori reflexo, abunde diversa. W.

* 32. **CREPIS filiformis.**

C. foliis lineari-filiformibus integerrimis glabris, pappo sessili. *Ait. Kew. 3. p. 128.*

Fadenblättriger Pippau. W.

Habitat in Madera. ♂.

Crepis neglecta Linnæi est planta valde dubia, nam sub hoc nomine aservatur in ejusdem herbario *Crepis nemausensis*. W.

* 1413. **HELMINTIA.**

Jusf. gen. ed. Uster. 190.

Recept. nudum. Cal. duplex; interior 8-phyllus aequalis; exterior 5-phyllus longitudine interioris. Sem. transversim striata.

Pappus stipitatus plumosus.

1. **HELMINTIA echioides.** W.

Picris (*echioides*) perianthiis exterioribus pentaphyllis, interiore aristato majoribus. *Sp. pl. 1214.* Neck. *gallob. p. 323.* *Huds. angl. 342.*

Picris calycibus simplicibus perianthio maximo obvalatis. *Hort. cliff. 537.* *Hort. ups. 241.* *Boy. lugdb. 128.* *Dalib. parif. 240.* *Gouan. monsp. 406.*

Picris calyce exteriori pentaphyllo maximo aculeato pappo stipitato, foliis repandis. *Smith. brit. 2. p. 814.* *

Hieracium *echioides* capitulis cardui benedicti. *Bauh. pin. 128.*

Boglossum *echioides* luteum hieracio cognatum. *Lob. ic. 577.*

β Hieracium capitulis cardui benedicti. *Herm. parad. 185. t. 185.*