

Jacq. coll. 5, 148.) — Auf sonnigen Hügeln zwischen Gesträuch (*Bmg. l. c.*) Jul. Aug. Im westlichen Siebenbürgen: Deva, Dobra, Broos. — Ist in unserem Floragebiete nicht so gemein, als *Bmg.* angibt.

465. CREPIS *L. p. p.*

Sect. I. Hieracioides DC. seu *Catonia* Mönch.

2109. *C. sibirica* *L. sp. 1135.* — *DC. prodr. 7, 167.* — *Ledeb. Ross. 2, 828.* — (*Hieracium sibiricum Lam. — Tratt. Oestr. t. 140.* — *Gmel. Sib. 2, t. 10.* — *Sogeria sibirica Monn. — Sonchus caucasicus Biehl. — S. flexuosus Ledeb.*) — Caule 2–3 ped. erecto, stricto, apice corymboso plus minus hirsuto. Foliis magis minusve hirsuto scabris obscure viridibus ellipticis, oblongisve, rugosis, grosse dentatis; caulinis inferioribus in petiolum profunde dentatum amplexicaulem attenuatis; mediis sessilibus amplexicaulis; supremis oblongis lanceolatisve sessilibus. Anthodiis maximis speciosis. *C. grandiflorae* similibus, sed peranthodii foliolis carina dense setosis demum subinde glabris, exterioribus laxe patentibus. Flosculis aureis. — In Bergwäldern, schattigen Bergwiesen, 3000'–4000'; auf dem Korondsys und dem Kuhlhorn bei Rodna; bei Klausenburg (Bogdani); Butsets bei Kronstadt; auch in den Fogaraser Gebirgen, Kolzu-Brasi 5000'. Jul. Aug.

2110. *C. grandiflora* *Tausch. Flora IX, 1, p. 80.* — *DC. prodr. 7, 176.* (*Hieracium grandiflorum All. ped. t. 29, t. 2 et 3. W. Kit. pl. rar. t. 99.* — *Bmg. 1668.* — *H. pappoleucum Vill. — H. conyzae-folium Gouan.*) — Auf bewachsenen Abhängen, Triften der Voralpen und Alpen: Fogaraser, Arpaser, Kerzesorer Alpen 5000'–6000'. Jul. Aug.

a. *simplex.* Caule simplici monocephalo, subhirsuto.

b. *oligocephala.* Caule superne 2–3 cephalo foliisque hirsuto. — Auf dem Arpás. Glimmerschiefer. Jul.

c. *corymboso montana.* Caule elato 2 ped. superne corymboso polycephalo. — Auf dem Butsets 4000'. Aug.

d. *glabrescens.* Caule oligocephalo, anthodiis foliisque demum omnino glabris. — Königstein bei Kronstadt, auf dem Ecsem-Teteje, Fogaraser Alpen. Jul. Aug.

2111. *C. blattarioides* *Vill. delph. 3, 136.* — (*C. austriaca Jacq. A. t. 441; Jacq. en. t. 5.* — *C. sibirica Gouan. ill. 60. [non L.]* — *Hieracium blattarioides L.; Bmg. 1660.* — *H. pyrenaicum L. syst. nat. ed. 10, p. 1095, non Roch.*) — Auf felsigen grasigen Abhängen der Voralpen und Alpen. (*Bmg. l. c.*) Jul. Aug.

a. *glabrescens amplexicaulis.* Caule pedali dense foliato, foliisque parce piloso demum glabro; pedunculis axillaribus monocephalis; foliis caulinis ovato-oblongis basi sagittata amplexicaulis, lobis rotundatis, foliisque callosodentatis, margine pilis brevibus ciliatis. Peranthodii foliolis exterioribus oblongis adpressis dorso margineque parce pilosis. Radice perenni multicipite. — (*C. amplexicaulis Schur herb. Transs.*) — An quelligen Orten des Arpás. 5000'. Jul. Aug.

2112. C. alpestris *Tausch* bot. Zeit. 11, 4, orig. Bl. p. 79. (Hieracium alpestre *Jacq.* A. t. 194; *Bmg.* 1639. — *Sturm.* H. 28.) — Auf Wiesen und Triften der Alpen. Jun. Aug.

Sect. II. *Eucrepis* DC. prodr. 7, 161.

2113. C. transsilvanica *Schur* herb. Transs. — Caule rigido 3 ped., striato-sulcato, setuloso-hispido, a medio ramoso, ramis elongatis curvato-ascendentibus, subnudis, apice laxe corymbosis. Foliis runcinato-pinnatifidis; caulinis amplexicaulibus basi profundius incisus, auriculatis, omnibus hispidis, carina aculeatis. Anthodii quam *C. biennis* gen. minoribus; flosculis aureo-flavis; peranthodii foliolis intus glabris extus tenue lanatis, exterioribus quandoque parce setosis; calyculi foliolis herbaceis adpressis. Fructibus supra medium versus apicem angustatis, striatis, pallide fuscis, glabris, laevibus pappum aequantibus. (*Crepis biennis* var. b. pinnatifida muriculata *Schur* sert. n. 1729.) — Auf Wiesen bei Hermannstadt häufig bei den drei Eichen, Bruckenthalwiese. Jul. Aug. Radix biennis!

2114. C. biennis *L.* *Bmg.* 1676. — Fl. dan. t. 1997. — *Engl.* bot. 149. — Auf Wiesen, Aeckern, bebautem und unbebautem Boden. Häufig auf Aeckern zwischen Saaten. Mai, August.

a. *scabriuscula*. Caule foliisque glabriusculis, foliis carina laevibus mollibus margine piloso-ciliatis. Hermannstadt. Jul.

b. *glabrescens*. Caule elato 2—3 ped., grosse sulcato, glabro interdum ad medium purpureo, fistuloso; foliis profunde pinnatifidis vel subbipinnatis, superioribus laceris margine excepto ciliato glabris, saturate viridibus, nitidis. Anthodii speciosis; floribus aureis; peranthodii foliolis glabriusculis atroviridibus. (An *C. biennis* var. β banatica *Rochel.* pl. rar. banat. f. 61.) — Auf Aeckern, vorzüglich auf Haferfeldern. Jul. Aug. Hermannstadt.

c. *humilis subdentata*. Caule subsimplici $1\frac{1}{2}$ ped. apice racemoso-corymboso foliisque scabriusculo; foliis integris antice latioribus obtusiusculis obverse lanceolatis versus basin sinuato-dentatis. — Auf Hügeln in Weinbergen bei Hermannstadt. Jun. Jul. 1500'.

2115. C. lodomeriensis *Bess.* Fl. galic. 2, p. 159. — DC. prodr. 7, 163. *Rehb.* exc. germ. p. 258. — *Gmel.* sib. 2, t. XI. — (*C. biennis* var. a. runcinato *Koch* syn. ed. 2, 504. — *C. tectorum* var. δ elata *Ledeb.* Ross. 2, 823.) — Caule sulcato, erecto, hispido, rigido, 2 ped. et ultra. Foliis subaequaliter runcinatis vel infimis integris et sinuato-dentatis, apice porrecto integris, laciniis dentibusque dorsum sensim sensimque minoribus et recurvis. Inflorescentia paniculato corymbosa; flosculis pallidioribus quam *C. biennis*. — Affinis *C. transsilvanicae* m. sed characteribus datis distincta. — Auf Wiesen, an Waldrändern der Hügelregion: Bilak bei Borbund, Heuwiese bei Klausenburg, Hermannstadt, Kronstadt. Jun. Aug.

2116. C. nicaeensis *Balb.* in *Pers.* syn. 2, 376. — *Koch* syn. ed. 2, 504. Media inter *C. virentem* et *biennem*, a *C. bienne* peranthodii