

Hab. in *Galliâ occidentali* — *Vendée* ; *Luçon* (abbé Guinand).

Foliorum et bracteis floriferis forma a sequentibus conspicue diversa, omnes ad gregem *C. pulchræ* L. sp. 1134, spectantes.

6. **Crepis trichosticta**, Gdgr.

Caulibus omnino valde glanduloso-hirtellis ; foliis oblongis apice parùm attenuatis, basi attenuatis, amplexicaulibus villosis, saturate virentibus, serratis haud runcinatis, 21-24 mill. latis ; foliorum auriculis erectis, triangulari-acutis.

Hab. in *Pedemontio* ; *Vallée d'Aoste* (*Thomas*, plant. exsicc.)

7. **Crepis Vendæana**, Gdgr.

Caule ad $\frac{1}{4}$ part. infer. villosus, superne glabro ; foliis anguste oblongo-lanceolatis sat acutis, basi paulo attenuatis, villosis, amœne virentibus, 11-13 mill. latis, subintegerrimis, amplexicaulibus ; auriculis vix perspicuis, subrotundatis.

Hab. in *Galliâ occidentali*. — *Vendée* ; *Luçon* (abb. Guinand.).

A præcedente foliis duplo angustioribus acutioribusque, habitu magis rigido etc., differt.

8. **Crepis cichoroides**, Gdgr.

Caule usque ad dimidiam infer., partem villosus ; foliis late oblongis, apice attenuato-obtusiusculis, basi attenuatis, pubescentibus, pallide viridibus, 20-23 mill. latis, inferioribus mediisque caulinis runcinato-pinnatifidis, superioribus autem valde dentatis, sessilibus, haud aut vix amplexicaulibus ; auriculis nullis.

Hab. in sabulosis *Delphinatus* circa *Grenoble* (*Chavanis ! Cornet ! Verlot ! David ! Chabert !* etc. et ipse).