

Caule elato, fistuloso, glanduloso, superne ramosissimo; foliis glabris, inferioribus runcinatum lyrato-pinnatipartitis, in petiolum basi sensim dilatatum abeuntibus, mediis runcinatis vel subintegris, basi sessili late et obtuse auriculatis, summis lanceolatis, integris; capitulis cylindricis, 8—10 floris; involucri glabri phyllis externis lanceolatis, acuminatis, internis triplo longioribus, obtusis; ligulis flavis; acheniis elliptico-linearibus, nigris, minute rugulosis, apice asperis, rostro 2—3 plo brevioribus, albo terminatis.

In collibus dumosis pr. monasterium Meteora supra Kalabaka Thessaliae (Haussk.). — Jun. Jul. ☉ N. v.

93. *Crepis* L. gen. n. 914.

Dispositio specierum:

1. Sectio. *Eucrepis* Bois. fl. or. III. p. 831. — Achenia exalata, apice plus minus attenuata, sed non rostrata.

a. Estolonosa; non tuberifera.

α. Perennes.

× Caulis foliatus (foliis interdum minimis), normaliter pleiocephalus.

○ Involucri phylla eglandulosa, praeter indumentum farinosum, dorso pilis crebris longis nigricantibus ciliata.

1. *C. geracioides* Haussk.

○○ Involucri phylla plus minus farinoso-tomentella, interdum glandulosa, pilis longis nigricantibus nullis.

. Folia radicalia obovato-oblonga, oblonga vel ovato-lanceolata, varie partita vel dentata.

; Rhizoma fusiforme.

, Flosculi lutei.

— Folia glandulosa.

2. *C. Baldaccii* Hal. 3. *C. Raulini* Bois.

:= Folia eglandulosa.

— Achenia scabra; folia tenera, dentata.

4. *C. auriculaefolia* Sieb.

== Achenia laevia; folia radicalia runcinata; plantae omnino eglandulosae.

5. *C. turcica* Deg. et Bald. 6. *C. divaricata* Bois. et Heldr.

7. *C. Sibthorpiana* Bois. et Heldr.

„ Flosculi rosei.

8. *C. incana* S. et S.

; Rhizoma praemorsum, longe et dense fibrosum.

, Involucrium pedunculisque glandulosum.

9. *C. Fraasii* Schultz. 10. *C. smyrnaea* DC.

„ Involucrium pedunculisque eglandulosum.

11. *C. Reuteriana* Bois.

.. Folia radicalia linearia, graminea, integra.

12. *C. crocifolia* Bois. et Heldr.

×× Caulis nanus, aphyllus vel subnudus, scapiformis, mono vel dicephalus.

13. *C. bithynica* Bois.

14. *C. Columnae* Ten.

Kyra (Heldr.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.), Vromölimni, in scopulo Angistri (Heldr.); Sporadum insula Jura (Leon.); insula Pontikonisi ad septentrionem Euboeae (Wild); Cycladum insula: Tenos, Syra (Weiss), Keos, Kythnos (Tunt.), Mykonos (Sart.), Thera (Heldr.); Cræta pr. Canea (Weiss). — Apr. Jun. ☉.

β. Pedunculi demum evidenter incrassati; involucri fructiferi, globosi apice contracti, phylla intima basi valde incrassata, achenia marginalia intus carinato-alata includentia.

26. **C. Dioscoridis** L. sp. ed. 2 p. 1133; S. et S. pr. II. p. 139, Fl. gr. t. 808; Urv. enum. p. 102; Ch. et B. exp. p. 235, Fl. pelop. p. 54; Bois. fl. or. III. p. 856; Heldr. fl. cephal. p. 50, chlor. Thera p. 16; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 29, Beitr. fl. Achaia p. 25, in ö. b. Z. 1895 p. 460, in z. b. G. 1899 p. 190. — *C. globifera* Hall. in naturw. Anz. 1818 p. 91. — *C. croatica* Horn. hort. hafn. suppl. p. 90. — *Gatyona globulifera* Cass. dict. 18 p. 184. — *G. Dioscoridis* Rehb. fl. germ. exc. p. 254. — *Endoptera Dioscoridis* DC. pr. VII. p. 172; Raul. cret. p. 800; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 663; Haussk. symb. p. 137. — Exsicc.: Oroph. fl. gr. n. 765; Heldr. herb. norm. n. 242 et 1354.

Parce papilloso-puberula vel glabra; caule erecto, solitario, superne vel a basi dichotome ramoso, ramis subdivaricatis, raro simplicibus, monocephalo; foliis inferioribus obovatis vel oblongis, runcinato-dentatis vel lyratis, in petiolum attenuatis, mediis lanceolatis, basi laciniata sagittata sessilibus, summis linearibus integris; pedunculis glabris vel parce glandulosis, fructiferis parum incrassatis; capitulis mediocribus; involucri tomentelli, interdum parce glandulosi, phyllis externis brevissimis, linearisetaceis, interioribus lanceolatis, demum incurvatis, basi valde incrassatis; ligulis luteis, involuero subduplo longioribus; acheniis incurvis, 5 costatis, apice breviter attenuatis; pappo caduco, involucrum parum superante.

In saxosis regionis inferioris et submontanae. Epirus: pr. Kalentini, Mazuki (Hal.); Thessalia: pr. Klinovo (Haussk.); Aetolia: pr. Guritza (Reis.), Mesolongion (Nied.), mt. Taphiassos (Hal.); Attica: insula Salamis, mt. Lycabettus, Hymettus, Parnes (Heldr.), pr. Geraka, Laurion (Haussk.); Acrocorinthus (Orph.); Argolis: in peninsula Methana (Haussk.), pr. Nauplia (Orph.), Astros (Bois.); Achaia: pr. Trikala (Heldr.), mt. Panachaicon, pr. Lopesi (Hal.); Messenia: pr. Pylos (Chaub.), Kalamata (Zahn); Laconia: pr. Androvista (Heldr.); Cythaera: pr. San Nicolo (Spreitz.); Creta (Raul.); Cycladum insula Camini pr. Thera (Urv.); Zante (Mazz.); Cephalonia: pr. Kastro (Heldr.). — Apr. Jun. ☉.

27. **C. tubaeformis**. — Exsicc.: Hal. it. gr. secund. a. 1893.

Glabra; caulibus numerosis, erectis vel adscendentibus, gracilibus, simplicibus monocephalis vel inferne furcatis dicephalis, superne nudis, valde tubuloso-incrassatis; foliis fere omnibus radicalibus, anguste lanceolatis, dentatis, in petiolum attenuatis, caulinis paucis, valde diminutis, anguste linearibus, integris vel basi laciniatis; capitulis parvulis; in-

volucris tomentelli, eglandulosi, phyllis externis lineari-setaceis, interioribus lanceolatis, demum incurvatis, basi valde incrassatis; ligulis ignotis; acheniis incurvis, 5 costatis, apice breviter attenuatis; pappo caduco, involuero brevior. — Differt a praecedente, cui affinis, caulibus numerosis simplicibus vel tantum semel furcatis, valde elongatis, subnudis, superne tubaeformibus, capitulis minoribus, pappo brevior et toto habitu, eo *Arnoseridis minimae* simili.

In rupestribus calcareis mt. Taphiassos ad sinum Patranum loco Kakiskala dicto Aetoliae (Hal.). — Maio. ○

b. Achenia interna in rostrum eis 2—3 plo longius abeuntia.

28. *C. aspera* L. sp. ed. 2 p. 1132; S. et S. pr. II p. 137, Fl. gr. t. 804; Bois. fl. or. III p. 857. — *Nemauchenus aculeata* Cass. dict. 34 p. 362. — *Endoptera aspera* DC. pr. VII p. 178; Raul cret. p. 800. —

Caulibus a medio dichotome ramosis, laxe cymoso-corymbosis, setis rigidis aculeiformibus hispidis; foliis margine asperis vel setoso-ciliatis, radicalibus oblongo-spathulatis, in petiolum brevem attenuatis, acute multidentatis, caulinis oblongis, laciniato-dentatis, auriculato-amplexicaulibus, summis linearibus, integris; capitulis parvis, centralibus et saepe lateralibus cymarum subsessilibus; pedunculis fructiferis crassiusculis; involucris fructiferi phyllis externis ovatis, scariosis, parvis, deciduis, internis tandem induratis, tomentellis, navicularibus, dorso incrassato aculeatis; acheniis marginalibus intus carinato-alatis, apice acutatis, internis, rostratis.

In graminosis Cretae (Sibth.); a recentioribus non lecta. — Maio, Jun. ○

94. *Hieracium* L. gen. n. 913.

Dispositio specierum:

1. Sectio. *Pilosella* Tausch in Flora 1828 Ergbl. I. p. 50. — Achenia ad summum 1½ mm. longa, nigra, costis apice in dentem brevem procurrentibus. — Rhizoma saepe stoloniferum; folia omnia vel plurima radicalia, rosulata; caulis scapiformis, aphyllus vel oligophyllus; innovatio per stolones, raro per rosulas.

a. Caulis monocephalus.

1. *H. macranthum* Ten.

b. Caulis pleiocephalus.

a. Caulis humilis, aphyllus vel monophyllus, apice 2—5cephalus.

2. *H. auricula* L.

β. Caulis elatior, foliatus, polycephalus, corymbosus.

× Folia elliptica, oblonga vel lanceolata, viridia, mollia, apice (praesertim superiora) saepius glandulosa; involucrem dense setosum griseum.

3. *H. cymosum* L.

×× Folia linearia vel lanceolata, glauca, apice eglandulosa; involucrem glabrum vel breviter puberulum et glanduliferum.

4. *H. florentinum* All.

5. *H. Bauhini* Schult.