

Б а й к а л ь с к и й х р.: истоки р. Малая Коса, влажные мелкоземно-щебнистые осыпи ниже снежников, 1—3 VIII 1967; истоки р. Мужинай, нивальные луговины, 13—16 VIII 1967.

123. *Crepis tungusica* Egor. et Sipl. sp. nov. — Rhizoma 2—5 mm crass., elongatum, obliquum, reliquiis atro-fuscis foliorum radicalium vetustorum vestitum, simplex vel paulo ramosum, caules in numero 1—3, 15—25 cm alt.; simplices vel paulo ramosi (ramis 1—2), fistulosi, tenue striati, sub calathidiis non incrassati, inferne parce pilosi, superne pilis albis crispis tecti; folia radicalia numerosa, 12—17 (20) cm lg. (cum petiolo); laminae tenues, lanceolatae, apice acutae, 10—20 mm lt., sinuato-dentatae vel lobatae, lobis anguste triangularibus acuminatis, denti et lobi in numero 1—5 vel folia integerrima; petioli laminis duplo longiores, anguste alati, parce pilosi, basi dilatati; folia caulina inferiora radicalibus similia, sed sessilia vel subsessilia; folia caulina superiora phyllis involucri similia. Calathidia in numero 1—2 (3), erecta; involucrem campanulatum, 7—11 mm lg. et 6—8 mm lt. (tempore florendi); involucri phylla extus atrovirentia, pilis albis crispis et longioribus patentibus viride nigris glandulosis densiuscule tecta, exteriora in numero 8—9, interioribus 1.5—2-plo breviora, ovato-lanceolata, ciliata; interiora in numero 12—13, oblongo-ciliata, facie interiore adpresse pilosa; receptaculum alveolatum, flores flavi, involucre fere duplo longiores; corolla 15—18 mm lg., ligula 1.5—2 mm lt.; achenia brunnescentia, 5.3—6 mm lg., fusiformia, costulata, costulis in numero 13, scabris; pappus 5—6.5 mm lg., albus. Fl. VII.

Т у р у с: Burjatia, lac. Baical, jugum Baicalense, ad fontem fl. Malaja Kosa, pratulae nivalis in declivibus schistosis, 2 VIII 1967, fl., fr., Т. Егорова et V. Siplivinsky (LE).

А ф ф и н и т а с. А specie proxima — *C. chrysantha* (Ledeb.) Turcz. caulibus sub calathidiis non incrassatis, involucri et acheniis minoribus differt, а *C. burejensis* Fr. Schmidt caulibus et foliis radicalibus majoribus involucri pubescentia glandulosa et rhizomate longiore differt.

Habitat in regione alpigena jugi Baicalensis.

Корневище 2—5 мм толщ., удлиненное, косое, одетое темно-бурыми остатками отмерших прикорневых листьев, простое или вверху слабо ветвистое, стебли в числе 1—3, 15—25 см выс., простые или с 1—2 боковыми ветвями, полые, тонкоребристые, под корзинкой не утолщенные, внизу скудно волосистые, вверху опушенные белыми курчавыми волосками; прикорневые листья многочисленные, 12—17 (20) см дл. (с черешками), пластинки листьев тонкие, ланцетовидные, приостренные, 10—20 мм шир., выемчато-зубчатые или узкотреугольно-лопастные, лопасти и

зубцы в числе 1—5 или листья цельнокрайные; черешки в 2 раза длиннее пластинок, узкокрылатые, негустоволосистые, при основании расширенные; нижние стеблевые листья сходные с прикорневыми, но сидячие или почти сидячие, самые верхние листья сходные с листочками обертки. Корзинки в числе 1—2 (3), прямостоячие; обертка колокольчатая, 7—11 мм дл. и 6—8 мм шир. (во время цветения), листочки обертки снаружи темно-зеленые, не густо опушены белыми курчавыми волосками и более длинными отстоящими зеленовато-черными железистыми волосками, наружные листочки обертки в числе 8—9, в 1.5—2 раза короче внутренних, яйцевидно-ланцетные, реснитчатые, внутренние в числе 12—13, продолговато-ланцетные, по краю пленчатые, на верхушке бороздато-реснитчатые, с внутренней стороны прижатоволосистые; цветоложе ячеистое, цветки желтые, в 2—3 раза длиннее обертки; венчик 15—18 мм дл., язычок 1.5—2 мм шир.; семянки буровато-коричневые, 5.3—6 мм дл., веретеновидные, с 13 шероховатыми ребрами; хохолок 5—6.5 мм дл., белый. Цв. VII.

Т и п: Бурятская АССР, оз. Байкал, Байкальский хр., истоки р. Малая Коса, нивальные луговины на щебнистых склонах, 2 VIII 1967, цв., пл., Т. В. Егорова, В. Н. Сипливинский (LE).

Р о д с т в о. Отличается от близкого вида *C. chrysantha* (Ledeb.) Turcz. не утолщенными под корзинками стеблями, меньшими размерами обертки и семянки; от *C. burejensis* отличается более крупными размерами стеблей и прикорневых листьев; железистым опушением обертки и удлинненным корневищем.

Растет в гольцовом поясе Байкальского хребта; возможно, окажется эндемом Станового нагорья.

#### 124. *Crepis chrysantha* (Ledeb.) Turcz.

В Прибайкалье этот вид известен по нескольким находкам на Баргузинском хребте.

Б а й к а л ь с к и й хр.: верховья р. Мужинай, альпийские и нивальные луговины, 15—16 VIII 1967.

#### 125. *Hieracium robustum* Fries.

Растения этого вида, по всей вероятности, не отграничивались от *H. viosum* Pall. и потому не приводились для Прибайкалья.

Б а й к а л ь с к и й хр.: верховья р. Малая Коса, на известняковой осыпи выше границы леса, 3 VIII 1967.

#### 126. *Hieracium korshinskyi* Zahn.

Также пропущенный для флоры Прибайкалья вид; распространен там довольно широко.