

involucrisque nigro-pilosis; involucri squamis acuminatis margine scariosis *DC. l. c.*

Crepis Bungei C. A. Mey. (nec Ledeb.) in litt.

Hieracium strictum Ledeb. fl. Alt. IV. p. 132.

H. uliginosum Turcz. cat. pl. Baic. Dah. n. 723.

Hieracium caule superius ramoso foliis paucis lanceolatis Gmel. fl. Sib. II. p. 30. n. 26. t. XIII. f. 1.

Capitula illis *C. tectorum* majora. Flores lutei.

In pratis humidis prope Kultuk, ad ostium Kiachtæ, ad fl. Czikoï et cæt. passim copiose provenit. Floret Junio, Julio. 2.

707. *CREPIS TURCZANINOWII C. A. Mey.*

C. caule subnudo ramoso pilis rigidis scabro; foliis radicalibus profunde dentatis, vel pinnatifido-runcinatis, rugulosis, tenuissime arachnoideis, rarius subglabris, laciniis subdenticulatis, caulinis inferioribus pinnatifidis, lobis angustissimis, summis linearibus filiformibusque integerrimis; ramis monocephalis; involucrio pilis viridi-flavescentibus nigricantibusve vestito, squamis exterioribus adpressis.

C. Turczaninowii C. A. Mey. in litt. enum. II. pl. Song. p. 32. in adn. ad Cr. oreadem Schrenkii.

C. Pallasii Turcz. cat. pl. Baic. Dah. n. 714. (nomen forte antiquius) Hieracium croceum Pall. itin (transbaic.) - Turcz. pl. exsicc. - DC. prodr. p. 163. (in adnot. ad Cr. auream.).

Hieracium polytrichum Bge. in suppl. ad fl. Alt. p. 602. (excl. var. γ.).

Caulis rarius simplex monocephalus, plerumque a basi vel apice in ramos 2-3-4-monocephalos divisus. Folia in caule, nonnisi ad originem ramorum. Flores pallide flavi. Involucrum præter pilos elongatos tomento molli incanescit. E varietatibus ab amic. *Bunge l. c.* commemoratis sola α . (*Hier. polytrichum Gmeliniannm*) apud nos crescit, quæ tamen nec caulem, nec folia glabra, apud nos habet; β . foliis dentatis, nec profunde incisus recedit; γ . diversissima et procul dubio species distincta. Varietas δ . caule humili et simplici, involucri pilis brevioribus atque tomento molli, varietatibus α . et β . peculiari destituta. Hanc in collectione, humanissime ab academia scientiarum Petropolitana, mecum communicata, sub denominatione *Hieracii crocati Bge.* accepi.

In lapidosis transbaicalensibus et Dahuricis minime rara.

Junio et Julio. 2.

Sectio II. INTYBELLIOIDES *DC. l. c.*

Intybellia Monn. nec Cass.—Geracii sp. Reichenb. —
Involucrum biseriale basi calyculatum. Achænia columnaria Scapus polycephalus. *DC. l. c.*

708. CREPIS PRÆMORSA *Less.*

C. scapo polycephalo racemoso, foliis que obovatis subcrenato-denticulatis, molliter hirtis; involucrio cylindræo calyculato glabriusculo, ligulis apice truncatis DC. l. c.

Crepis præmorsa Less. syn. p. 137. Fræcl. in DC. prodr. l. c. — Koch syn. fl. Germ. p. 437.

Hieracium præmorsum Linn. sp. 1126. — Spreng. syst. veg. III. p. 638. — Ledeb. fl. Alt. IV. p. 128.