

328. *CREPIS. Recept. nudum. Cal. calyculatus squamis deciduis. Pappus plumosus stipitatus.*

CRÉPIDE. Réceptacle nu. Calyce ayant à sa base des écailles caduques. Aigrettes plumeuses et pédiculées.

*FETIDA.* 1. *foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis.* Linn. sp. pl. 1133. Vaill. Par. 189. Dalib. Par. 238. Moris. hist. 3. s. 7. t. 4. f. 4.

*Habitat ad versuras. Flores lutei; Julio, Augusto.* ☉

1. CRÉPIDE FÉTIDE. Feuilles découpées profondément, de manière à paroître ailées, et dont la surface est hérissée de poils. Pétioles dentés. Fleurs jaunes; en Juillet et Août. Se trouve sur les bords des chemins et fossés.

*TECTORUM.* 2. *C. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus: inferioribus dentatis.* Linn. sp. pl. 1135. Dalib. Par. 238. Vaill. act. 1718. Moris. hist. 3. s. 7. t. 7. f. 29.

*Habitat in aridis, in tectis. Flores idem; Augusto, Septembri.* ☉

2. CRÉPIDE DES TOITS. Feuilles sessiles, lisses, profondément découpées vers la base, et lancéolées vers le haut; les inférieures dentées en leur bord. Fleurs jaunes; en Août et Septembre. Se trouve au Mont-Valérien et plaine de Nanterre.

*LINIFOLIA.* 3. *C. caule erecto: foliis angusto-lineariibus, integris: corymbo paucifloro; pedunculis unifloris, longiusculis.*

*Habitat in locis sterilibus. Flores idem; Julio.* ☉

3. CRÉPIDE A FEUILLES LINÉAIRES. Feuilles entières. Corymbe pauciflore. Pédoncules un peu longs, ne portant qu'une

seule fleur de couleur jaune ; en Juillet. Se trouve dans le parc de Vincennes.

*BIENNIS.* 4. *C. foliis runcinato - pinnatifidis scabris : basi supernè dentatis, calycibus muricatis.* Linn. sp. pl. 1136. Vaill. act. 1718. Vaill. Par. 103. Bauh. hist. pl. 2. p. 1025. ic.

*Habitat in pratis humidis. Flores idem ; Maio, Junio. ♂*

4. CHICORÉE D'HIVER. Feuilles à découpages profondes qui les font paroître ailées ; ayant leur surface glabre au toucher et leur base dentée. Calyces garnis d'écaillés en chausse-trape. Fleurs jaunes ; en Mai et Juin. Se trouve dans les prés humides.

*TARAXACIFOLIA.* 5. *C. caule assurgente, puberulo : foliis hirsutatis, subsulcato-runcinatis, dentatis : floribus corymbosis : calycibus albidò-pulverulentis.*

*Habitat in pratis artificiosis. Flores idem ; Aprili, Maio. ♂*

5. CRÉPIDE A FEUILLES DE PISENLIT. Tige redressée, peu élevée, finement pubescente, verdâtre. Feuilles roncées, à lobes recourbés et dentés. Calyces comme pulvérulents-blanchâtres. Fleurs en corymbe et jaunes ; en Avril et Mai. Se trouve dans les prairies artificielles.

*VIRENS.* 6. *C. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subtomentosis.* Linn. sp. pl. 1134. Vaill. Par. 102. Tournef. Par. 99.

*Habitat in agris. Flores idem ; Junio, Julio. ☉*

6. CRÉPIDE VÉNÉNEUSE. Feuilles profondément découpées, glabres et amplexicaules. Calyce un peu cotonneux. Fl. jaunes ; en Juin et Juillet. Se trouve dans les lieux cultivés.

Obs. Le caractère le plus tranchant pour séparer ce genre du précédent, consiste dans la blancheur de l'aigrette qui est à poils simples.

*UMBELLATA.* 7. *C. foliis sublanceolato-spathulatis, subacutis, deorsum longissimè angustatis, inæqualitè repando-*

*denticulatis* : scapo aphyllō, apice umbellifero ; floribus breviusculè pedicellatis ; centrali sessili.

*Habitat in pratis siccis. Flores idem ; Julio.* ☞

7. CRÉPIDE A OMBELLES. Feuilles lancéolées-spathulées, plus ou moins aiguës, longuement rétrécies, inégalement denticulées. Hampe nue, terminée par une ombelle régulière. Fleurs jaunes, courtement pédonculées ; celle du centre sessile ; en Juillet. Se trouve dans les prés secs du Château de Villegenis.

UNIFLORA. 8. *C. foliis omissō nervo puberulo glabris, sinuato-runcinatis, integris : scapo foliis subæquali, unifloro.*

*Habitat in locis sterilibus. Flores idem ; Julio.* ☉

8. CRÉPIDE UNIFLORE. Feuilles glabres et à nervures pubescentes, roncînées, entières. Hampe à une seule fleur de couleur jaune ; en Juillet. Se trouve dans les bois de Boulogne et de Vincennes.

DIOSCORIDIS. 9. *C. foliis radicalibus runcinatis, caulibus hastatis ; calycibus subtomentosis.* Linn. sp. pl. 1133. Vaill. act. 715. et Par. 102.

*Habitat in agris et arvis. Flores idem ; Æstate.* ☉

9. CRÉPIDE DE DIOSCORIDE. Feuilles radicales profondément découpées ; les caulinaires en fer de pique. Calyces un peu cotonneux. Fleurs jaunes ; tout l'Été. Se trouve dans les endroits cultivés.

PULCHRA. 10. *C. foliis sagittatis denticulatis, caule paniculato, calycibus piramydatis glabris.* Vaill. act. 1721. Moris. hist. 3. s. 7. t. 5. f. 37. Reich. syst. pl. tom. III. p. 654. Dalib. Par. 238.

*Habitat ad versuras. Flores idem ; Junio.* ☉

10. CRÉPIDE ÉLÉGANTE. Feuilles en fer de flèche et légèrement dentées. Tige paniculée. Calyces glabres et en forme de