

328. *CREPIS*. Recept. nudum. Cal. calyculatus squamis deciduis. Pappus plumosus stipitatus.

CRÉPIDE. Réceptacle nu. Calyce ayant à sa base des écailles caduques. Aigrettes plumeuses et pédiculées.

*FETIDA*. 1. *C. foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis*. Linn. sp. pl. 1133. Vaill. Par. 189. Dalib. Par. 238. Moris. hist. 3. s. 7. t. 4. f. 4.

*Habitat ad versuras. Flores lutei; Julio, Augusto.* ☉

1. CRÉPIDE FÉTIDE. Feuilles découpées profondément, de manière à paroître ailées, et dont la surface est hérissée de poils. Pétioles dentés. Fleurs jaunes; en Juillet et Août. Se trouve sur les bords des chemins et fossés.

*TECTORUM*. 2. *C. foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus: inferioribus dentatis*. Linn. sp. pl. 1135. Dalib. Par. 238. Vaill. act. 1718. Moris. hist. 3. s. 7. t. 7. f. 29.

*Habitat in aridis, in tectis. Flores idem; Augusto, Septembri.* ☉

2. CRÉPIDE DES TOITS. Feuilles sessiles, lisses, profondément découpées vers la base, et lancéolées vers le haut; les inférieures dentées en leur bord. Fleurs jaunes; en Août et Septembre. Se trouve au Mont-Valérien et plaine de Nanterre.

*LINIFOLIA*. 3. *C. caule erecto: foliis angusto-lineari-bus, integris: corymbo paucifloro; pedunculis unifloris, longiusculis.*

*Habitat in locis sterilibus. Flores idem; Julio.* ☉

3. CRÉPIDE A FEUILLES LINÉAIRES. Feuilles entières. Corymbe pauciflore. Pédoncules un peu longs, ne portant qu'une

*denticulatis* : scapo aphylo, apice umbellifero ; floribus breviusculè pedicellatis ; centrali sessili.

*Habitat in pratis siccis. Flores idem ; Julio.* ¶

7. CRÉPIDE A OMBELLES. Feuilles lancéolées-spathulées, plus ou moins aiguës, longuement rétrécies, inégalement denticulées. Hampe nue, terminée par une ombelle régulière. Fleurs jaunes, courtement pédonculées ; celle du centre sessile ; en Juillet. Se trouve dans les prés secs du Château de Villegenis.

UNIFLORA. 8. *C. foliis omissa nervo puberulo glabris, sinuato-runcinatis, integris : scapo foliis subæquali, unifloro.*

*Habitat in locis sterilibus. Flores idem ; Julio.* ©

8. CRÉPIDE UNIFLORE. Feuilles glabres et à nervures pubescentes, roncinnées, entières. Hampe à une seule fleur de couleur jaune ; en Juillet. Se trouve dans les bois de Boulogne et de Vincennes.

DIOSCORIDIS. 9. *C. foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis ; calycibus subtomentosis.* Linn. sp. pl. 1133. Vaill. act. 715. et Par. 102.

*Habitat in agris et arvis. Flores idem ; Æstate.* ©

9. CRÉPIDE DE DIOSCORIDE. Feuilles radicales profondément découpées ; les caulinaires en fer de pique. Calyces un peu cotonneux. Fleurs jaunes ; tout l'Été. Se trouve dans les endroits cultivés.

PULCHRA. 10. *C. foliis sagittatis denticulatis, caule paniculato, calycibus piramidatis glabris.* Vaill. act. 1721. Moris. hist. 3. s. 7. t. 5. f. 37. Reich. syst. pl. tom. III. p. 654. Dalib. Par. 238.

*Habitat ad versuras. Flores idem ; Junio.* ©

10. CRÉPIDE ÉLÉGANTE. Feuilles en fer de flèche et légèrement dentées. Tige paniculée. Calyces glabres et en forme de