

*Cr. montana* Tausch. — Auf der Sekirica planina bei Andrijevica ca. 1600 m.

*Cr. paludosa* Mch. — Quellige Stellen im Peručica-Thale unter der Hasanac planina; dann auf einer feuchten Wiese bei Berane (Sandžak Novi-Pazar).

Für Montenegro neu, jedoch mit den böhmischen Pflanzen gut übereinstimmend.

*Cr. Columnae* Froel. — Alpenmatten auf der Sekirica planina, Zeletin und Balj (bei Andrijevica), Bjelasica pl. und Javorje planina, ca. 1200—2000 m.

Die Pflanze ist sehr variabel. Der Stengel ist bald niedrig, bald bis über 30 cm hoch, die Hüllblättchen sind fast kahl oder dicht schwarzbehaart, die Blätter ganzrandig oder schrotsägeförmig gesägt. (Vergl. Pant. Adnotat. pag. 49. und Rohl., Dritter Beitr. zur Fl. v. Mont. p. 42.)

*Cr. chondrilloides* Jacq. — Auf Karstwiesen bei Zagarač oberhalb Danilovgrad.

*Cr. rigida* W. K. var. *Crepis adenophylla*. —

*Foliis utrinque caulibusque (inflorescentia excepta) glandulis flavis et nigris densissime tectis.*

Auf sonnigen Lehnen bei Borkovići oberhalb Monastir Piva. (1904). Nach der Mittheilung des H. Prof. Dr. K. VANDAS kommt diese Pflanze auch in Hercegovina vor.

— var. *Crepis viscosissima*. —

*Caule, foliis, inflorescentia, involuacroque densissime glanduloso-viscosis.*

Um Viluša an der hercegovinischen Grenze (1904.)

*Cr. biennis* L. — Wiesen um Andrijevica.

*Cr. Nicaeensis* Balb. — Karstwiesen bei Kokoti (Lješanska nahija).

*Crepis Vandasii* sp. n.

Sectio *Eucrepis* Boiss. Fl. or. III. 831.

Perennis, radice fusiformi verticali, colli squamoso, caulibus subglabris vel parum puberulis tenuibus, gracilibus, ca. 30 cm. altis monocephalis vel in 2—3 ramos tenues monocephalos divisus basi sicut foliorum petiola rubescentibus, foliis subglabris vel ad nervos puberulis, radicalibus rosultatis in petiolum sensim attenuatis primis obovato oblongis margine irregulariter dentatis, ceteris lanceolato-oblongis runcinatis, segmentis lanceolatis acutis integris vel acute dentatis, petiolis basi dilatatis, foliis caulinis paucis (2—3), infimo radicalibus

simili, sequenti angustissime lanceolato indiviso integro (rarius acute dentato), supremo minuto anguste lanceolato, capitulis mediocribus, involucri pilis albis hyalinis eglandulosis et flavis glanduliferis obsito, involucri phyllis anguste lanceolatis exterioribus duplo vel triplo interioribus brevioribus, ligulis flavis involucri duplo longioribus, pappo niveo involucrum parum superanti, acheniis apice attenuatis (nec rostratis) multistriatis pappo sublongioribus.

Proxime affinis *Cr. athoae* Boiss. (Sint. Bornmüller 1891. Exsicc. Nro. 860.) quae tamen a nostra foliis minus divisis, segmentis brevioribus, involucri eglanduloso, eius phyllis margine scariosis interioribus obtusis satis differre videtur.

Synon.: *Crepis adenantha* Pichler in sched. non Visiani (Lovčen 21. Juni 1868). — Auf Felsen am Lovčen oberhalb Njeguši (leg. Kr. Pejović).

*Cr. dinarica* Beck.

Alpenmatten auf der Sekirica planina und auf dem Jablan vrh bei Kolašin, ca. 1600—2200 m.

Mit den bosnischen Pflanzen (in alpinis montis Treskavica, 1888. VII. leg. Beck) vollkommen übereinstimmend.

*Cr. bulbosa* Tausch. — Am Strande bei Ulcinj und Bar; dann am Ufer des Skadarsko blato bei Vir.

*Cr. rubra* L. — Bei Ulcinj.

*Cr. foetida* L. — Trockene Grasplätze bei Podgorica.

*Cr. rhoeadifolia* M. B. — Auf sonnigen, grasigen Abhängen bei Andrijevic nicht häufig.

*Cr. taraxacifolia* Th. — Berislavici nächst Plavnica, bei Podgorica und Andrijevic nicht häufig.

*Cr. setosa* Hall. f. — Auch um Vir, Kokoti (Lješanska nahija), Danilovgrad verbreitet; um Andrijevic nur in wärmeren Lagen; auch bei Berane (Sandž. Novi-Pazar).

*Cr. neglecta* L. — Im Gebiete der Mediterranflora verbreitet.

*Lagoseris bifida* K. — In wärmeren Lagen verbreitet; auch um Andrijevic, aber seltener.

*Zacyntha verrucosa* G. — Bei Podgorica und Kokoti (Lješanska nahija).

*Tragopogon porrifolius* L. — Um Podgorica und Kokoti (Lješanska nahija).

*Tr. pratensis* L. — Podgorica, Andrijevic.