

rostro superante l'involucro, scabro-irtto. ♂. Indicata dei *C. Euganei* (TREVISAN), Bresc. sul Dosso alto, Bergam. in Val Seriana e Val Camonica ed Alpi piem. (BALB.); non ne vedemmo esempl. ital. Giu. Lugl. [Transs. Taur. Cauc. As. occ. Sib. alt.] — Barkhaus. scariosa Mœnch — B. alp. DC. — Billotia Sch. Bip. — Anthochytrium Rchb. f.

6 C. alpina L. 3898

d) *Lepidoseris* Rchb.

13 (9) Pianta più o meno setoloso-pubescente. Rd. fusiforme. Fusti solcati, eretti, semplici in basso e ramoso-corimbosi in alto, più raram. ramosi dalla base ed ascendenti (2-10 dm.). Fg. infer. picciolate, bislungo-spatolate, dentate, roncinato-pennatifide o lirate, le altre orecchiuto-amplessicauli, lanceolato-acuminate, dentate alla base. Peduncoli eretti prima dell'antesi, pubescenti-biancastri assieme agli involucri ed inoltre generalm. muniti di setole nere, glandolifere. Capolini mediocri; involucro campanulato, a squame esterne più o meno ampie e patenti, le interne bislungo-lanceolate, verdi-scure sulla carena e bianco-scariose al margine. Fl. $\frac{1}{2}$ -1 volta più lunghi dell'involucro. Stigmi bruno-lividii. Acheni grigiastri, scabrosetti, i periferici a rostro un po' più breve dei centrali, questi a rostro uguale al corpo o più lungo. ♂. ♂. 2f. [Eur. media e mer. Afr. bor.]. — Barkhausia Spr. — Volg. *Radicchiella*, *Radicchio scottellato*.

7 C. vesicaria L. 3899

A Brattee dell'infiorescenza e squame esterne dell'involucro larghe, oblunghe od ovate, concave, quasi interam. scariose.

a Fl. gialli, i periferici porporini all'esterno. — Squame invol. esterne assai più brevi dell'involucro od anche (*b. scariosa* [W.]) = *C. vesic. β* L. = Barkhausia scar. Rchb.) più grandi e subeguali all'involucro. Fg. infer. più o meno pelose od anche (*c. glabrifolia* Nob.) quasi glabre. — Luoghi erbosi dal mare alla reg. mont. nell'Istria, Pen., Sic., Egadi, Eolie, Sard. al Golfo Aranci (GESTRO!), Ischia e Tremili (MARTELLI in hb. flor.). Apr.-Giu.

α TYPICA

b Fl. rosso-porporini, bianchicci o solfino-pallidissimi. — In Sic.; indicata anche dell'Abr. a Chiarino (TEN.). — Barkhausia Biv. — *C. Bivoniana* Rchb., Spr.

β PURPUREA (GUSS.)

B Brattee dell'infiorescenza e squame esterne dell'involucro strette, le prime linearie, le seconde ovato-lanceolate, tutte strettam. scariose.

I Fg. roncinato-pennatifide o roncinato-dentate, lirate, — le caulinne amplessicauli od anche (*b. præcox* [Balb.]) = Barkh. Rchb.) le super. dilatato-orecchiute alla base. Pianta nei luoghi caldi (*c. biennialis* [Spr.]) = Barkh. Biv. = *B. reflexa* J. et C. Presl = *C. taraxacoides* Guss., an Desf.? a fioritura precoce (dal nov. al magg.) e per lo più glabra o quasi nelle fg. radicali. Peduncoli ed involucri nella for. b. non glandulosi ovvero (*d. glandulifera* Guss.) setoloso-glandulosi, nella for. c. sempre più o meno forniti di setole nere. — Indicata dell'It. bor. dal Triest. al Nizz. e Lig., Parmig., Bologn., Avellino, Sic. e Sard.; la for. c. nelle Puglie e Basil. (TEN.), Sic. e Sard. — *C. taurinensis* W. — Barkhausia DC.

γ TARAXACIFOLIA (THUILL.)¹⁾

II Fg. indivise, denticolate, bislungo-spatolate, — glabre. Fioritura precoce. — In Sic. Nov.-Magg. — Barkhausia Spr. — *C. spath. v. montana* N. Terr. (quid?).

δ SPATHULATA (GUSS.)

e) *Ægoseris* Rchb.

14 (8) Piante perenni o bienni.

15

— Piante annue.

17

¹⁾ Mancando gli acheni, la *C. vesic. v. taraxacifolia* potrebbe confondersi con *C. biennis*; ma se ne distingue per i fl. periferici rossi all'esterno e per gli stigmi bruno-lividii (invece che gialli).