

***Crepis Kernerii* × *terglouensis*.**

Syn. *C. chondrilloides* × *terglouensis* (*C. hybrida*) A. Kerner, Sched. ad fl. exs. Austr.-Hung. 199, 1881; Österr. Bot. Zeitschr. 20, 120, 1870.

Belege: Salzburg, Leoganger Steinberge, Birnhorn, 2300 m (K. H. R.); Tirol, Karwendelgebirge, Solstein bei Innsbruck (J. Schneider), Brennergebiet, Blaser bei Matrei (Obrist in Kerner, Fl. exs. Austr.-Hung. 199, Huter), Hühnerspiel, 2200—2400 m (Huter in Schultz, Herb. norm. 1407), Platzerberg bei Gossensaß, 2300—2400 m (Huter), Gschnitztal (R. Wettstein).

***Crepis Jacquini* × *terglouensis*; *C. intermixta* Rech. fil., nov. hybr.**

A *C. Jacquini* differt caule humiliore, superne incrassato, univel bicephalo, capitulo duplo usque triplo crassiore, involucri phyllis latioribus dense nigrovillosis, foliis latioribus brevioribus minus divisis. — A *C. terglouensi* differt caule elongato interdum bicephalo, foliorum segmento terminali elongato acuto, lateralibus angustioribus acutioribus.

Belege: Warscheneckgruppe, Roßarsch, 2100 m (K. H. R.), Totes Gebirge, Spitzmauer, 2000 m (K. H. R.), Dachstein, Gjaidstein, 2100 m (K. H. R.).

Résumé.

L'auteur donne des indications sur les caractères et la distribution de quelques espèces dans les Alpes orientales: *Euphorbia austriaca*, *Aconitum platanifolium*, *Knautia intermedia*, *Arctium nemorosum*, *Adenostyles Alliariae* × *glabra*. Ensuite *Crepis Jacquini* est étudié. Cette espèce se trouve dans les Carpathes occidentales et dans les Alpes boreo-orientales (à l'Est de la Salzach). Le groupement se trouvant à l'occident de la Salzach jusqu'aux Grisons et dans les Alpes australes du Tirol jusqu'à l'Albanie doit être séparé comme espèce nouvelle et indépendant sous le nom de *Crepis Kernerii* Rech. fil. Ces deux espèces forment des hybrides avec *C. terglouensis*.

Karl von Poellnitz: Neue *Anthericum*-Arten.

1. *Anthericum bracteatum* Thode in sched. — Differt *A. acuto* C. H. Wright pedunculo quam folia breviora, bracteis non longe cuspidatis, tepalis angustioribus, filamentis sublongioribus, antheris distincte longioribus. — § *Phalangium* L. — 1—2 Fuß hoch (Thode). — Vorliegende Pflanze: Rhizom oben 1 cm breit. Borsten zahlreich, braun, 2½—3 cm lang. Blätter etwa 8, die zwei äußeren kurz, die anderen 40—45 cm lang, 6—7 mm breit, getrocknet grünlich, matt,