

TRIB. 2.

7. OPORINIA. *Involucrum* profundè multipartitum, basi squamis aliquot adpressis munitum. *Receptaculum* favosum. *Antheræ* basi bisetæ. *Achenia* subfusiformia, compressa, sulcata: *sulcis* transversè rugosis. *Pappi radiis* simplici ordine distinctis, persistentibus, plumosis, basi scarioso-dilatatis!

Herba (Europæa) perennis, radice præmorsa. *Folia plurima radicalia, læviuscula, sæpius pinnatifida.* *Scapi ramosi, declinati, glabri.* *Flores pedunculati, aurei.* *Pedunculi squamosi, fistulosi, apice dilatati.*

Huc Apargia autumnalis Willd. Apargia longè diversa est involucro imbricato, pappi radiis dupli ordine digestis; exterioribus simplicibus duplò brevioribus.

8. CALLIOPEA. *Involucrum* simplici serie polyphyllum, subtorulosum, basi squamulis paucis instructum. *Receptaculum* nudum, punctatum. *Flosculi* fauce extùs imberbi! *Antheræ* basi bisetæ. *Stigmata* pruinosa. *Achenia* teretia, lævia. *Pappus capillaris:* *radiis* simplici ordine confertis, denticulatis, æqualibus, caducis.

Herba (Europæa) perennis, cæspitosa, radice fibrosa. *Folia radicalia, petiolata, runcinata, glabra.* *Scapus uniflorus, lævis.* *Flos saturate fulvus.* *Involuci squamis carinatis, satis aterrime hispidis, apice membranaceis.* *Pappus niveus.*

Huc Leontodon aureum L.

9. ÆTHONIA. *Involucrum* simplici ordine polyphyllum, basi squamis brevissimis adpressis munitum. *Receptaculum* scrobiculato-scabrum. *Antheræ* basi bisetæ. *Stigmata* linear-ligulata, papillosa. *Achenia* pentagona: *angulis* sulcatis, lævibus. *Pappi radii* 12, setaceis, denticulato-scabris, æqualibus, persistentibus, imâ basi callosis!

Plantæ (Canarienses) suffruticosæ. *Folia dentata.* *Flores citrini.*

Huc Hieracium fruticosum Willd. Crepis filiformis Hort. Kew.; et Tolpis lagopoda Sm. Can. Tolpis genere certè distinctissima involucro squamis plurimis prælongis laxis calyculatum, receptaculo alveolato, acheniis ancipiti-compressis, pappo paleaceo difformi.

10. TROXIMON. *Involucrum* dupli ordine polyphyllum: *foliolis* æqualibus, adpressis. *Receptaculum* favosum. *Antheræ* basi biaristatae. *Stigmata* semicylindrica, papillosa. *Achenia* elongata, sulcata. *Pappi radiis* dupli ordine digestis, persistentibus, setaceo-paleaceis, longis, æqualibus.

Herbæ (Amer. Bor.) perennes, foliis gramineis, scapis unifloris, floribus luteis.

Huc Troximon dandelion Gærtn. T. glaucus Pursh. T. cuspidatus Pursh.

11. CYNTHIA. *Involucrum* multipartitum: *segmentis* dupli ordine digestis. *Receptaculum* scrobiculatum. *Antheræ* basi bidentatae. *Stigmata* linear-ligulata, pruinosa. *Achenia* ovalia, complanata. *Pappus duplex;* *exterior* paleaceus, brevissimus; *interior* pilosus, scaber.

Herba (Amer. Bor.) perennis, glaberrima, glauca. *Caules nudiusculi, 2-3-flori.* *Folia lævissima, oblonga;* *radicalia lyrata;* *caulina superiore integrerima.* *Flores aurci.* *Involucrum laxe.*

Huc Troximon virginicus Gærtn.