

rissée de poils et de soies glochidiées et de spinules éparses à base calleuse. — Fl. mai.

Collines marneuses du bas Chélif : Dahra, Ouled-Brahim, M'sila.

omihda.
Deckera montana (*Helminthia montana*, Pom. msc. herb.)

Calathides solitaires au sommet de longs pédoncules peu ou pas épaissis, dressés, naissant à l'aisselle d'une bractée, disposées en lâche panicule. Péricline à folioles extérieures peu distinctes des autres, lancéolées, dressées étalées, terminées par une épine, les intérieures oblongues terminées par une arête épineuse courte. Akènes obovés, hérissés-veloutés, brusquement atténués en bec grêle plus long qu'eux ; réceptacle fortement alvéolé. Feuilles radicales en rosette ovales ou oblongues, atténuées en pétiole, les caulinaires petites, sessiles non embrassantes, recourbées, très épineuses. Tige dressée, raide, rameuse dès le 1/3 inférieur, à rameaux 1-2 fois subdichotomes ; souche vivace. Plante hérissée de poils glochidiés et de spinules éparses. — Fl. juin.

Lieux rocheux des montagnes : Zaccar.

Deckera callosa (*Helminthia callosa*, Pom. msc. herb.). = *D. aculeata* Pch. Nj.

Calathides solitaires sur des pédoncules plus ou moins longs, terminaux et axillaires, disposées en corymbe irrégulier, à rameaux divariqués. Péricline à folioles extérieures étalées, à la fin réfléchies, subégales, très distinctes des intérieures, ovales ou lancéolées, terminées en épine ; folioles intérieures oblongues, submutiques. Akènes ovoïdes-fusiformes, un peu velus vers le sommet, atténués en un bec très grêle 2 fois aussi long qu'eux. Feuilles inférieures obovées ou oblongues, à pétiole canaliculé, un peu éparses et non en rosette au moment de l'anthèse, les caulinaires plus étroites,