

**Deckera racemosa** (*Helminthia racemosa*,  
Pom. msc. herb.).

Calathides portées par de courts et épais pédoncules axillaires et disposées en grappe plus ou moins allongée, très-serrée dans le haut. Folioles extérieures du péricline, 5-6, subcordiformes à la base, ovales, grandes, dressées, ciliées-épineuses, les intérieures bien plus longues, atténuées, membraneuses aux bords, aristées sous le sommet. Akènes oblongs, un peu ventrus en dedans, pourvus de rugosités transversales fines et espacées, atténués en bec robuste plus court qu'eux ; aigrette très-fragile égalant l'akène en longueur. Feuilles radicales en rosette, pétiolées, oblongues, sinuées aux bords, les caulinaires sessiles un peu atténuées à la base. Tige dressée, raide, simple, robuste ; souche verticale, épaisse, vivace. Plante hérissée de soies glochidiées et d'aiguillons implantés sur un tubercule. Fleurs jaunes. — Fl. juin.

Lieux rocheux et calcaires des montagnes : Zaccar, Jurjura.

**Deckera glomerata** (*Helminthia glomerata*,  
Pom. msc. herb.).

Calathides subsessiles agglomérées 4-3 à l'aisselle des feuilles supérieures ou sur des rameaux axillaires très-courts et disposées en une grappe composée. Péricline à folioles extérieures, ovales, spinuleuses, dressées, puis étalées, un peu plus larges que les intérieures, celles-ci oblongues, calleuses, un peu aristées, hispides sur la nervure. Akènes pourvus de faibles rugosités, insensiblement atténués en bec plus long qu'eux et muriculé à sa base. Feuilles radicales en rosette, ovales, oblongues, à pétiole scarieux aux bords, irrégulièrement sinuées, dentées ; les caulinaires étalées, étroites, dilatées embrassantes à la base. Tige simple, robuste, dressée à souche vivace, épaisse, verticale. Plante hé-