

Fidelia trivialis (*Leontodon* [*deloderium*] *triviale*, Ball.) est vivace; son akène est insensiblement atténué; son réceptacle est fibrilleux et non palacé comme dans les vrais *deloderium*. *Fidelia hispidula* Sch. bip. (*Leontodon delilianum*, Ball.), est plus hispide que le *F. reboudiana* et en diffère surtout par le bec de l'akène du double plus long. *Apargia annua*, Vis., que Schulz rapporte à son *Fidelia*, par ses akènes érostres serait un *Leontodon*.

Millina chicoracea (Ten. sub. *Leontodon*) =
M. leontodontoïdes, Cass.

Deckera rubiginosa (*Helminthia rubiginosa*).

Péricline à folioles extérieures dressées, ovales lancéolées, un peu hérissées sur la nervure, ciliées de soies glochidiées peu robustes, égalant au moins moitié des intérieures; celles-ci hérissées de poils sétiformes sur la nervure et sur l'appendice long et linéaire qui naît sous leur sommet. Akènes longs de 7^{mm}, à bec un peu plus court que le fruit. Feuilles radicales en rosette, et caulinaires inférieures atténuées en pétiole, oblongues lancéolées, dentées, plus ou moins hérissées de poils glochidiés; les caulinaires petites, embrassantes, lancéolées, cordiformes. Tige dressée, simple ou plus souvent rameuse, à rameaux étalés, portant des calathides, les unes subsessiles, les autres pédonculées, souvent glomérulées 2 à 3, rarement en grappe courte. Souche vivace verticale. Fl. mai.

Broussailles des terrains de porphyre : cap Cavallo.

Hyoseris radiata, L.

Var. *hispidula*. Péricline hérissé de poils courts crépus, à folioles extérieures égalant presque moitié des intérieures. Akènes ailés peu larges, insensiblement atténués vers le